

# Indicadores básicos de salud

# CHILE 2011





## Presentación

Para la publicación de “Indicadores Básicos de Salud”, preparada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de Chile, seleccionamos datos provenientes de diferentes fuentes oficiales.

Al igual que anteriores publicaciones presentamos indicadores clásicos: demográficos, socioeconómicos, de estadísticas vitales, de riesgos para la salud, de acceso a la atención y recursos, distribuidos por región y resumen de indicadores generales del país.

Este trabajo estadístico pretende contribuir con información relativa a la situación de salud de los chilenos.

**Departamento de Estadísticas e Información de Salud**  
**Ministerio de Salud - Chile**

**Diciembre 2011**

## Algunos Indicadores Generales de Chile, 2009-2011

Indicador	Número	Valor Relativo	Fuente	Año
<b>Población</b>	<b>17.248.450</b>		1	2011
Hombres	8.536.904		1	2011
Mujeres	8.711.546		1	2011
<b>Esperanza de vida (*)</b>			1	2010-2015
Hombres	74,95		1	2010-2015
Mujeres	80,66		1	2010-2015
<b>Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)</b>		<b>1,89</b>	2	2010
<b>Nacidos vivos y natalidad (por 1.000 habitantes)</b>	<b>253.584</b>	<b>14,98</b>	2	2009
<b>Atención profesional del parto (%)</b>		<b>99,80</b>	2	2009
<b>Nacidos vivos con bajo peso al nacer (%)</b>	<b>14.946</b>	<b>5,93</b>	2	2009
<b>Nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (%)</b>	<b>40.702</b>	<b>16,14</b>	2	2009
<b>Años de vida potencial perdidos (AVPP) (por 1.000 habitantes)</b>	<b>1.258.476</b>	<b>76</b>	2	2009
Hombres	810.946	106	2	2009
Mujeres	447.530	54	2	2009
<b>Defunciones totales y mortalidad general (por 1.000 habitantes)</b>	<b>91.965</b>	<b>5,43</b>	2	2009
<b>Defunciones de menores de 1 año y mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)</b>	<b>1.997</b>	<b>7,90</b>	2	2009
<b>Razón de mortalidad menores de 5 años</b>	<b>2.315</b>	<b>9,13</b>	2	2009
<b>Defunciones maternas y mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)</b>	<b>50</b>	<b>19,72</b>	2	2009
<b>Defunciones por síntomas, signos y hallazgos anormales no clasificados en otra parte (%)</b>	<b>2.403</b>	<b>2,61</b>	2	2009
<b>Defunciones y tasa de mortalidad (por 100.000 habitantes):</b>				
<b>Ambos sexos de 20 a 44 años</b>	<b>7.168</b>	<b>112,29</b>	2	2009
Hombres	5.201	162,08	2	2009
Mujeres	1.967	61,96	2	2009
<b>Ambos sexos de 45 a 64 años</b>	<b>18.938</b>	<b>510,72</b>	2	2009
Hombres	11.996	661,72	2	2009
Mujeres	6.942	366,28	2	2009
De 20 a 64 años por Enfermedades Sistema Circulatorio (CIE-10: I00-I98)	5.034	49,88	2	2009
De 20 a 64 años por Tumores Malignos (CIE-10: C00-C97)	7.194	71,29	2	2009
De 20 a 64 años por Enfermedades Sistema Respiratorio (CIE-10: J00-J99)	1.337	13,25	2	2009
De 20 a 64 años por Causas Externas de Mortalidad (CIE-10: V01-Y98)	5.525	54,75	2	2009
De 20 a 64 años por Cirrosis Hepática y Otras Enfermedades Crónicas del Hígado (CIE-10: K70-K76)	2.291	22,70	2	2009
De 20 a 64 años por Síntomas, Signos y Hallazgos Anormales no Clasificados en otra parte (CIE-10: R00-R99)	449	4,45	2	2009
<b>Cobertura de Inmunizaciones (%):</b>				
BCG (Recién nacido)		96,9	3	2010
Pentavalente (3ra. dosis)		93,5	3	2010
Trivírica (12 meses)		94,4	3	2010


# Algunos Indicadores Generales de Chile, 2009-2011

Indicador	Número	Valor Relativo	Fuente	Año
<b>Consultas médicas SNSS según nivel ó instancia de la atención (por habitante)</b>				
Total	<b>41.961.527</b>	<b>2,45</b>	3	2010
Atención Primaria	16.253.988	0,95	3	2010
Atención de Especialidades	6.979.693	0,41	3	2010
Atención de Urgencia	18.727.846	1,10	3	2010
<b>Atención de hospitalización, sector público y privado</b>				
Camas de Hospitalización	34.829		3	2010
Número de egresos hospitalarios	1.657.103		3	2009
<b>Índice de desarrollo Humano</b>				
Valor		0,805	4	2011
Ranking Mundial	44		4	2011


**Fuentes: 1. INE; 2. CNEV; 3. DEIS-MINSAL; 4. Informe Mundial de Desarrollo Humano, ONU**

(\*) Evolución de la mortalidad en Chile según causas de muerte y edad 1990-2007: Publicación especial  
 Sub-Departamento de Estadísticas Demográficas Publicación: 29 de diciembre de 2010:  
[http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/calendario\\_de\\_publicaciones/pdf/010211/evo90\\_07\\_010211.pdf](http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/calendario_de_publicaciones/pdf/010211/evo90_07_010211.pdf)

## Chile: Población Estimada al 30 de Junio de 2011, por Grupos Quinquenales de Edad y Sexo



## Defunciones por grandes grupos de causa de muerte. Chile 1990-2009



## Chile: Algunos indicadores de mortalidad por causa, según sexo. 2009

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
C00-C97	<b>Tumores malignos</b>	<b>22.637</b>	<b>133,7</b>
	Hombres	11.753	140,3
	Mujeres	10.884	127,3
I00-I99	<b>Enfermedades del sistema circulatorio</b>	<b>24.838</b>	<b>146,7</b>
	Hombres	12.690	151,4
	Mujeres	12.148	142,1
J00-J99	<b>Enfermedades del sistema respiratorio</b>	<b>8.933</b>	<b>52,8</b>
	Hombres	4.634	55,3
	Mujeres	4.299	50,3
K00-K93	<b>Enfermedades del sistema digestivo</b>	<b>6.726</b>	<b>39,7</b>
	Hombres	4.232	50,5
	Mujeres	2.494	29,2
V00-Y98	<b>Causas externas de mortalidad</b>	<b>8.151</b>	<b>48,1</b>
	Hombres	6.362	75,9
	Mujeres	1.789	20,9
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
I20-I25	<b>Enfermedad isquémica del corazón</b>	<b>7.299</b>	<b>43,1</b>
	Hombres	4.408	52,6
	Mujeres	2.891	33,8
I60-I69	<b>Enfermedades cerebrovasculares</b>	<b>8.130</b>	<b>48,0</b>
	Hombres	3.961	47,3
	Mujeres	4.169	48,8
E10-E14	<b>Diabetes mellitus</b>	<b>3.253</b>	<b>19,2</b>
	Hombres	1.598	19,1
	Mujeres	1.655	19,4
J12-J18	<b>Neumonía</b>	<b>3.516</b>	<b>20,8</b>
	Hombres	1.759	21,0
	Mujeres	1.757	20,6
K70-K76	<b>Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	<b>4.168</b>	<b>24,6</b>
	Hombres	2.970	35,4
	Mujeres	1.198	14,0
V02-V04; V09.-; V12-V14; V19-V79; V86-V89	<b>Ciertos accidentes de transporte terrestre</b>	<b>2.084</b>	<b>12,3</b>
	Hombres	1.659	19,8
	Mujeres	425	5,0
X60-X84	<b>Lesiones autoinfligidas intencionalmente</b>	<b>2.148</b>	<b>12,7</b>
	Hombres	1.724	20,6
	Mujeres	424	5,0
B20-B24	<b>Infección por VIH y SIDA</b>	<b>435</b>	<b>2,6</b>
	Hombres	365	4,4
	Mujeres	70	0,8
A15-A19	<b>Tuberculosis</b>	<b>232</b>	<b>1,4</b>
	Hombres	160	1,9
	Mujeres	72	0,8

Fuente: DEIS-MINSAL | \*Tasa por 100.000 habitantes

# Región de Arica y Parinacota: Indicadores Básicos


Indicadores demográficos (2011)	
<b>Población (ambos sexos)</b>	<b>183.190</b>
Hombres	88.592
Mujeres	94.598
Índice de masculinidad	93,65
<b>Esperanza de vida</b>	
Hombres	75,20
Mujeres	82,09
Porcentaje de población de menores de 15 años	22,99
Porcentaje de población de 65 y más años	10,56
Indicadores de Estadísticas Vitales (2009)	
Natalidad (número de nacidos vivos)	3.559
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	19,12
Mortalidad general (número de defunciones)	1.065
<b>Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)</b>	<b>5,72</b>
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,6
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	4,9
Mortalidad materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	56,20
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	8,4
Mortalidad neonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	5,1
Mortalidad postneonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	3,4
Razón de mortalidad menores de 5 Años	8,99
Porcentaje de defunciones por "Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos"	3,38
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2009)	5,06
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2009)	15,14
<b>Años de vida potencial perdidos</b>	<b>15.639</b>
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	86
<b>Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS (2010):</b>	
Gestantes (mal nutrición por déficit)	8,44
Gestantes (mal nutrición por exceso)	50,38
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	1,86
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	35,46
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	13,86
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	48,13
Indicadores de acceso a la atención (2009-2010)	
<b>Atención de hospitalización, sector público y privado</b>	
Camas de hospitalización	360
Número de egresos hospitalarios	20.584
<b>Atención ambulatoria otorgada por el SNSS</b>	
<b>Consultas médicas según nivel o instancia de la atención</b>	
Total	438.951
Atención primaria	165.015
Atención de especialidades	131.093
Atención de urgencia	142.843
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	46,92
<b>Cobertura de inmunizaciones</b>	
BCG (recién nacido)	100,0
Pentavalente (3a. dosis)	100,0
Trivírica (12 meses)	100,0

Algunos indicadores de mortalidad por causa, según sexo. 2009		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Todas las causas</b>	<b>1.065</b>	<b>572,1</b>
Hombres	599	660,3
Mujeres	466	488,3
<b>Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)</b>	<b>251</b>	<b>134,8</b>
Hombres	146	160,9
Mujeres	105	110,0
<b>Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)</b>	<b>218</b>	<b>117,1</b>
Hombres	115	126,8
Mujeres	103	107,9
<b>Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)</b>	<b>109</b>	<b>58,6</b>
Hombres	56	61,7
Mujeres	53	55,5
<b>Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)</b>	<b>98</b>	<b>52,6</b>
Hombres	49	54,0
Mujeres	49	51,3
<b>Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)</b>	<b>74</b>	<b>39,8</b>
Hombres	62	68,3
Mujeres	12	12,6
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)</b>	<b>66</b>	<b>35,5</b>
Hombres	44	48,5
Mujeres	22	23,1
<b>Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)</b>	<b>74</b>	<b>39,8</b>
Hombres	33	36,4
Mujeres	41	43,0
<b>Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)</b>	<b>41</b>	<b>22,0</b>
Hombres	21	23,2
Mujeres	20	21,0
<b>Neumonía (CIE-10: J12-J18)</b>	<b>37</b>	<b>19,9</b>
Hombres	19	20,9
Mujeres	18	18,9
<b>Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)</b>	<b>67</b>	<b>36,0</b>
Hombres	38	41,9
Mujeres	29	30,4
<b>Ciertos accidentes de transporte terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)</b>	<b>31</b>	<b>16,7</b>
Hombres	26	28,7
Mujeres	5	5,2
<b>Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)</b>	<b>12</b>	<b>6,5</b>
Hombres	12	13,2
Mujeres	0	0,0
<b>VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)</b>	<b>19</b>	<b>10,2</b>
Hombres	14	15,4
Mujeres	5	5,2
<b>Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)</b>	<b>7</b>	<b>3,8</b>
Hombres	3	3,3
Mujeres	4	4,2


\*Tasa por 100.000 habitantes

## Región de Arica y Parinacota: Indicadores Básicos

Arica y Parinacota: Población Estimada al 30 de Junio de 2011,  
por Grupos Quinquenales de Edad y Sexo.



Defunciones por grandes grupos de causa de muerte.  
Región de Arica y Parinacota, 2009





## Región de Tarapacá: Indicadores Básicos


Indicadores demográficos (2011)	
<b>Población (ambos sexos)</b>	<b>321.726</b>
Hombres	167.204
Mujeres	154.522
Índice de masculinidad	108,21
<b>Esperanza de vida</b>	
Hombres	75,74
Mujeres	80,32
Porcentaje de población de menores de 15 años	24,15
Porcentaje de población de 65 y más años	6,47
Indicadores de Estadísticas Vitales (2009)	
Natalidad (número de nacidos vivos)	5.740
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	18,67
Mortalidad general (número de defunciones)	1.196
<b>Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)</b>	<b>3,89</b>
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	4,2
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	3,6
Mortalidad materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	34,84
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	8,7
Mortalidad neonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	6,4
Mortalidad postneonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 Años	9,93
Porcentaje de defunciones por "Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos"	3,68
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2009)	5,18
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2009)	16,23
<b>Años de vida potencial perdidos</b>	<b>21.100</b>
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	70
<b>Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS (2010):</b>	
Gestantes (mal nutrición por déficit)	5,62
Gestantes (mal nutrición por exceso)	55,09
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	3,77
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	32,55
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	9,94
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	50,17
Indicadores de acceso a la atención (2009-2010)	
<b>Atención de hospitalización, sector público y privado</b>	
Camas de hospitalización	444
Número de egresos hospitalarios	27.001
<b>Atención ambulatoria otorgada por el SNS</b>	
<b>Consultas médicas según nivel o instancia de la atención</b>	
Total	797.839
Atención primaria	325.527
Atención de especialidades	110.492
Atención de urgencia	361.820
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	57,11
<b>Cobertura de inmunizaciones</b>	
BCG (recién nacido)	100,0
Pentavalente (3a. dosis)	100,0
Trivírica (12 meses)	100,0

Algunos indicadores de mortalidad por causa, según sexo. 2009		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Todas las causas</b>	<b>1.196</b>	<b>389,0</b>
Hombres	669	419,2
Mujeres	527	356,5
<b>Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)</b>	<b>285</b>	<b>92,7</b>
Hombres	154	96,5
Mujeres	131	88,6
<b>Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)</b>	<b>279</b>	<b>90,80</b>
Hombres	151	94,6
Mujeres	128	86,6
<b>Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)</b>	<b>98</b>	<b>31,90</b>
Hombres	59	37,0
Mujeres	39	26,4
<b>Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)</b>	<b>98</b>	<b>31,9</b>
Hombres	56	35,1
Mujeres	42	28,4
<b>Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)</b>	<b>130</b>	<b>42,3</b>
Hombres	98	61,4
Mujeres	32	21,7
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)</b>	<b>97</b>	<b>31,6</b>
Hombres	60	37,6
Mujeres	37	25,0
<b>Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)</b>	<b>99</b>	<b>32,2</b>
Hombres	48	30,1
Mujeres	51	34,5
<b>Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)</b>	<b>43</b>	<b>14,0</b>
Hombres	21	13,2
Mujeres	22	14,9
<b>Neumonía (CIE-10: J12-J18)</b>	<b>34</b>	<b>11,1</b>
Hombres	22	13,8
Mujeres	12	8,1
<b>Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)</b>	<b>63</b>	<b>20,5</b>
Hombres	44	27,6
Mujeres	19	12,9
<b>Ciertos accidentes de transporte terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)</b>	<b>39</b>	<b>12,7</b>
Hombres	33	20,7
Mujeres	6	4,1
<b>Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)</b>	<b>31</b>	<b>10,1</b>
Hombres	23	14,4
Mujeres	8	5,4
<b>VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)</b>	<b>9</b>	<b>2,9</b>
Hombres	7	4,4
Mujeres	2	1,4
<b>Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)</b>	<b>4</b>	<b>1,3</b>
Hombres	3	1,9
Mujeres	1	0,7


\*Tasa por 100.000 habitantes

## Región de Tarapacá: Indicadores Básicos

Tarapacá: Población Estimada al 30 de Junio de 2011,  
por Grupos Quinquenales de Edad y Sexo.



Defunciones por grandes grupos de causa de muerte.  
Región de Tarapacá, 2009



## Región de Antofagasta: Indicadores Básicos


Indicadores demográficos (2011)	
<b>Población (ambos sexos)</b>	<b>581.701</b>
Hombres	302.787
Mujeres	278.914
Índice de masculinidad	108,56
<b>Esperanza de vida</b>	
Hombres	73,34
Mujeres	78,75
Porcentaje de población de menores de 15 años	24,06
Porcentaje de población de 65 y más años	6,47
Indicadores de Estadísticas Vitales (2009)	
Natalidad (número de nacidos vivos)	10.046
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	17,67
Mortalidad general (número de defunciones)	2.628
<b>Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)</b>	<b>4,62</b>
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	5,0
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	4,2
Mortalidad materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	19,91
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	8,3
Mortalidad neonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	5,6
Mortalidad postneonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2,7
Razón de mortalidad menores de 5 Años	10,15
Porcentaje de defunciones por "Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos"	2,93
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2009)	6,92
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2009)	17,13
<b>Años de vida potencial perdidos</b>	<b>46.498</b>
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	83
<b>Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS (2010):</b>	
Gestantes (mal nutrición por déficit)	9,48
Gestantes (mal nutrición por exceso)	50,65
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	4,01
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	24,91
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	10,03
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	46,08
Indicadores de acceso a la atención (2009-2010)	
<b>Atención de hospitalización, sector público y privado</b>	
Camas de hospitalización	1.350
Número de egresos hospitalarios	66.699
<b>Atención ambulatoria otorgada por el SNS</b>	
<b>Consultas médicas según nivel o instancia de la atención</b>	
Total	923.689
Atención primaria	283.339
Atención de especialidades	179.404
Atención de urgencia	460.946
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	33,69
<b>Cobertura de inmunizaciones</b>	
BCG (recién nacido)	94,1
Pentavalente (3a. dosis)	89,5
Trivírica (12 meses)	85,8

Algunos indicadores de mortalidad por causa, según sexo. 2009		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Todas las causas</b>	<b>2.628</b>	<b>462,3</b>
Hombres	1.476	498,8
Mujeres	1.152	422,7
<b>Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)</b>	<b>683</b>	<b>120,2</b>
Hombres	383	129,4
Mujeres	300	110,1
<b>Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)</b>	<b>633</b>	<b>111,40</b>
Hombres	354	119,6
Mujeres	279	102,4
<b>Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)</b>	<b>223</b>	<b>39,2</b>
Hombres	120	40,6
Mujeres	103	37,8
<b>Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)</b>	<b>201</b>	<b>35,4</b>
Hombres	138	46,6
Mujeres	63	23,1
<b>Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)</b>	<b>247</b>	<b>43,5</b>
Hombres	182	61,5
Mujeres	65	23,9
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)</b>	<b>238</b>	<b>41,9</b>
Hombres	162	54,7
Mujeres	76	27,9
<b>Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)</b>	<b>190</b>	<b>33,4</b>
Hombres	94	31,8
Mujeres	96	35,2
<b>Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)</b>	<b>65</b>	<b>11,4</b>
Hombres	32	10,8
Mujeres	33	12,1
<b>Neumonía (CIE-10: J12-J18)</b>	<b>82</b>	<b>14,4</b>
Hombres	42	14,2
Mujeres	40	14,7
<b>Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)</b>	<b>128</b>	<b>22,5</b>
Hombres	98	33,1
Mujeres	30	11,0
<b>Ciertos accidentes de transporte terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)</b>	<b>90</b>	<b>15,8</b>
Hombres	68	23,0
Mujeres	22	8,1
<b>Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)</b>	<b>52</b>	<b>9,2</b>
Hombres	37	12,5
Mujeres	15	5,5
<b>VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)</b>	<b>20</b>	<b>3,5</b>
Hombres	14	4,7
Mujeres	6	2,2
<b>Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)</b>	<b>4</b>	<b>0,7</b>
Hombres	3	1,0
Mujeres	1	0,4


\*Tasa por 100.000 habitantes

## Región de Antofagasta: Indicadores Básicos

Antofagasta: Población Estimada al 30 de Junio de 2011,  
por Grupos Quinquenales de Edad y Sexo.



Defunciones por grandes grupos de causa de muerte.  
Región de Antofagasta, 2009



## Región de Atacama: Indicadores Básicos


Indicadores demográficos (2011)	
<b>Población (ambos sexos)</b>	<b>282.575</b>
Hombres	144.250
Mujeres	138.325
Índice de masculinidad	104,28
<b>Esperanza de vida</b>	
Hombres	75,28
Mujeres	81,19
Porcentaje de población de menores de 15 años	24,10
Porcentaje de población de 65 y más años	8,19
Indicadores de Estadísticas Vitales (2009)	
Natalidad (número de nacidos vivos)	5.238
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	18,81
Mortalidad general (número de defunciones)	1.363
<b>Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)</b>	<b>4,89</b>
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	5,5
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	4,3
Mortalidad materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	0,00
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	12,0
Mortalidad neonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	8,4
Mortalidad postneonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	3,6
Razón de mortalidad menores de 5 Años	12,60
Porcentaje de defunciones por "Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos"	3,15
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2009)	6,14
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2009)	19,08
<b>Años de vida potencial perdidos</b>	<b>22.521</b>
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	82
<b>Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS (2010):</b>	
Gestantes (mal nutrición por déficit)	8,45
Gestantes (mal nutrición por exceso)	53,03
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	3,03
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	30,92
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	8,01
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	49,07
Indicadores de acceso a la atención (2009-2010)	
<b>Atención de hospitalización, sector público y privado</b>	
Camas de hospitalización	568
Número de egresos hospitalarios	26.831
<b>Atención ambulatoria otorgada por el SNS</b>	
<b>Consultas médicas según nivel o instancia de la atención</b>	
Total	686.621
Atención primaria	218.521
Atención de especialidades	101.930
Atención de urgencia	366.170
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	61,43
<b>Cobertura de inmunizaciones</b>	
BCG (recién nacido)	100,0
Pentavalente (3a. dosis)	100,0
Trivírica (12 meses)	95,9

Algunos indicadores de mortalidad por causa, según sexo. 2009		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Todas las causas</b>	<b>1.363</b>	<b>489,4</b>
Hombres	777	546,7
Mujeres	586	429,7
<b>Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)</b>	<b>310</b>	<b>111,3</b>
Hombres	158	111,2
Mujeres	152	111,5
<b>Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)</b>	<b>325</b>	<b>116,7</b>
Hombres	176	123,8
Mujeres	149	109,3
<b>Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)</b>	<b>146</b>	<b>52,4</b>
Hombres	94	66,1
Mujeres	52	38,1
<b>Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)</b>	<b>83</b>	<b>29,8</b>
Hombres	47	33,1
Mujeres	36	26,4
<b>Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)</b>	<b>139</b>	<b>49,9</b>
Hombres	114	80,2
Mujeres	25	18,3
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)</b>	<b>83</b>	<b>29,8</b>
Hombres	56	39,4
Mujeres	27	19,8
<b>Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)</b>	<b>115</b>	<b>41,3</b>
Hombres	60	42,2
Mujeres	55	40,3
<b>Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)</b>	<b>53</b>	<b>19,0</b>
Hombres	30	21,1
Mujeres	23	16,9
<b>Neumonía (CIE-10: J12-J18)</b>	<b>33</b>	<b>11,9</b>
Hombres	21	14,8
Mujeres	12	8,8
<b>Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)</b>	<b>59</b>	<b>21,2</b>
Hombres	36	25,3
Mujeres	23	16,9
<b>Ciertos accidentes de transporte terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)</b>	<b>40</b>	<b>14,4</b>
Hombres	33	23,2
Mujeres	7	5,1
<b>Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)</b>	<b>35</b>	<b>12,6</b>
Hombres	29	20,4
Mujeres	6	4,4
<b>VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)</b>	<b>4</b>	<b>1,4</b>
Hombres	4	2,8
Mujeres	0	0,0
<b>Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)</b>	<b>5</b>	<b>1,8</b>
Hombres	3	2,1
Mujeres	2	1,5


\*Tasa por 100.000 habitantes

## Región de Atacama: Indicadores Básicos

Atacama: Población Estimada al 30 de Junio de 2011,  
por Grupos Quinquenales de Edad y Sexo.



Defunciones por grandes grupos de causa de muerte.  
Región de Atacama, 2009



# Región de Coquimbo: Indicadores Básicos


Indicadores demográficos (2011)	
<b>Población (ambos sexos)</b>	<b>728.934</b>
Hombres	360.920
Mujeres	368.014
Índice de masculinidad	98,07
<b>Esperanza de vida</b>	
Hombres	76,13
Mujeres	82,02
Porcentaje de población de menores de 15 años	22,78
Porcentaje de población de 65 y más años	9,79
Indicadores de Estadísticas Vitales (2009)	
Natalidad (número de nacidos vivos)	10.856
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	15,33
Mortalidad general (número de defunciones)	3.605
<b>Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)</b>	<b>5,09</b>
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	5,7
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	4,5
Mortalidad materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	9,21
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	7,3
Mortalidad neonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	4,7
Mortalidad postneonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2,6
Razón de mortalidad menores de 5 Años	8,38
Porcentaje de defunciones por "Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos"	5,05
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2009)	5,58
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2009)	18,88
<b>Años de vida potencial perdidos</b>	<b>47.031</b>
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	68
<b>Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS (2010):</b>	
Gestantes (mal nutrición por déficit)	8,57
Gestantes (mal nutrición por exceso)	51,06
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,96
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	31,24
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	9,78
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	49,40
Indicadores de acceso a la atención (2009-2010)	
<b>Atención de hospitalización, sector público y privado</b>	
Camas de hospitalización	962
Número de egresos hospitalarios	52.311
<b>Atención ambulatoria otorgada por el SNS</b>	
<b>Consultas médicas según nivel o instancia de la atención</b>	
Total	1.564.266
Atención primaria	627.597
Atención de especialidades	266.691
Atención de urgencia	669.978
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	53,37
<b>Cobertura de inmunizaciones</b>	
BCG (recién nacido)	98,2
Pentavalente (3a. dosis)	96,8
Trivárica (12 meses)	91,7

Algunos indicadores de mortalidad por causa, según sexo. 2009		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Todas las causas</b>	<b>3.605</b>	<b>508,9</b>
Hombres	2.010	573,1
Mujeres	1.595	446,0
<b>Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)</b>	<b>929</b>	<b>131,2</b>
Hombres	507	144,6
Mujeres	422	118,0
<b>Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)</b>	<b>928</b>	<b>131,0</b>
Hombres	496	141,4
Mujeres	432	120,8
<b>Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)</b>	<b>361</b>	<b>51,0</b>
Hombres	218	62,2
Mujeres	143	40,0
<b>Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)</b>	<b>235</b>	<b>33,2</b>
Hombres	150	42,8
Mujeres	85	23,8
<b>Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)</b>	<b>291</b>	<b>41,1</b>
Hombres	226	64,4
Mujeres	65	18,2
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)</b>	<b>268</b>	<b>37,8</b>
Hombres	171	48,8
Mujeres	97	27,1
<b>Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)</b>	<b>277</b>	<b>39,1</b>
Hombres	139	39,6
Mujeres	138	38,6
<b>Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)</b>	<b>113</b>	<b>16,0</b>
Hombres	44	12,5
Mujeres	69	19,3
<b>Neumonía (CIE-10: J12-J18)</b>	<b>137</b>	<b>19,3</b>
Hombres	68	19,4
Mujeres	69	19,3
<b>Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)</b>	<b>130</b>	<b>18,4</b>
Hombres	95	27,1
Mujeres	35	9,8
<b>Ciertos accidentes de transporte terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)</b>	<b>69</b>	<b>9,7</b>
Hombres	53	15,1
Mujeres	16	4,5
<b>Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)</b>	<b>96</b>	<b>13,6</b>
Hombres	79	22,5
Mujeres	17	4,8
<b>VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)</b>	<b>18</b>	<b>2,5</b>
Hombres	14	4,0
Mujeres	4	1,1
<b>Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)</b>	<b>6</b>	<b>0,9</b>
Hombres	4	1,1
Mujeres	2	0,6


\*Tasa por 100.000 habitantes

## Región de Coquimbo: Indicadores Básicos

Coquimbo: Población Estimada al 30 de Junio de 2011,  
por Grupos Quinquenales de Edad y Sexo.



Defunciones por grandes grupos de causa de muerte.  
Región de Coquimbo, 2009





## Región de Valparaíso: Indicadores Básicos


Indicadores demográficos (2011)	
<b>Población (ambos sexos)</b>	<b>1.777.470</b>
Hombres	875.399
Mujeres	902.071
Índice de masculinidad	97,04
<b>Esperanza de vida</b>	
Hombres	74,93
Mujeres	80,27
Porcentaje de población de menores de 15 años	20,83
Porcentaje de población de 65 y más años	10,94
Indicadores de Estadísticas Vitales (2009)	
Natalidad (número de nacidos vivos)	23.822
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	13,69
Mortalidad general (número de defunciones)	10.793
<b>Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)</b>	<b>6,22</b>
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,6
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,8
Mortalidad materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	20,99
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	8,4
Mortalidad neonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	5,8
Mortalidad postneonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2,6
Razón de mortalidad menores de 5 Años	9,70
Porcentaje de defunciones por "Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos"	1,83
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2009)	6,14
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2009)	15,69
<b>Años de vida potencial perdidos</b>	<b>127.555</b>
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	75
<b>Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS (2010):</b>	
Gestantes (mal nutrición por déficit)	7,58
Gestantes (mal nutrición por exceso)	52,57
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,61
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	30,17
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	9,92
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	51,09
Indicadores de acceso a la atención (2009-2010)	
<b>Atención de hospitalización, sector público y privado</b>	
Camas de hospitalización	4.239
Número de egresos hospitalarios	181.712
<b>Atención ambulatoria otorgada por el SNS</b>	
<b>Consultas médicas según nivel o instancia de la atención</b>	
Total	4.510.935
Atención primaria	1.667.191
Atención de especialidades	687.523
Atención de urgencia	2.156.221
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	84,07
<b>Cobertura de inmunizaciones</b>	
BCG (recién nacido)	90,9
Pentavalente (3a. dosis)	90,4
Trivírica (12 meses)	100,0

Algunos indicadores de mortalidad por causa, según sexo. 2009		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Todas las causas</b>	<b>10.793</b>	<b>620,3</b>
Hombres	5.634	657,6
Mujeres	5.159	584,2
<b>Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)</b>	<b>2.724</b>	<b>156,6</b>
Hombres	1.443	168,4
Mujeres	1.281	145,1
<b>Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)</b>	<b>3.260</b>	<b>187,4</b>
Hombres	1.604	187,2
Mujeres	1.656	187,5
<b>Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)</b>	<b>1.084</b>	<b>62,3</b>
Hombres	553	64,6
Mujeres	531	60,1
<b>Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)</b>	<b>713</b>	<b>41,0</b>
Hombres	435	50,8
Mujeres	278	31,5
<b>Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)</b>	<b>682</b>	<b>39,2</b>
Hombres	502	58,6
Mujeres	180	20,4
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)</b>	<b>1.098</b>	<b>63,1</b>
Hombres	624	72,8
Mujeres	474	53,7
<b>Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)</b>	<b>1.068</b>	<b>61,4</b>
Hombres	490	57,2
Mujeres	578	65,5
<b>Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)</b>	<b>314</b>	<b>18,1</b>
Hombres	146	17,0
Mujeres	168	19,0
<b>Neumonía (CIE-10: J12-J18)</b>	<b>413</b>	<b>23,7</b>
Hombres	203	23,7
Mujeres	210	23,8
<b>Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)</b>	<b>426</b>	<b>24,5</b>
Hombres	292	34,1
Mujeres	134	15,2
<b>Ciertos accidentes de transporte terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)</b>	<b>168</b>	<b>9,7</b>
Hombres	132	15,4
Mujeres	36	4,1
<b>Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)</b>	<b>220</b>	<b>12,6</b>
Hombres	162	18,9
Mujeres	58	6,6
<b>VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)</b>	<b>57</b>	<b>3,3</b>
Hombres	46	5,4
Mujeres	11	1,3
<b>Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)</b>	<b>24</b>	<b>1,4</b>
Hombres	16	1,9
Mujeres	8	0,9


\*Tasa por 100.000 habitantes

## Región de Valparaíso: Indicadores Básicos

Valparaíso: Población Estimada al 30 de Junio de 2011,  
por Grupos Quinquenales de Edad y Sexo.



Defunciones por grandes grupos de causa de muerte.  
Región de Valparaíso, 2009



# Región Metropolitana de Santiago: Indicadores Básicos


Indicadores demográficos (2011)	
<b>Población (ambos sexos)</b>	<b>6.945.593</b>
Hombres	3.388.586
Mujeres	3.557.007
Índice de masculinidad	95,27
<b>Esperanza de vida</b>	
Hombres	75,62
Mujeres	81,05
Porcentaje de población de menores de 15 años	21,67
Porcentaje de población de 65 y más años	9,03
Indicadores de Estadísticas Vitales (2009)	
Natalidad (número de nacidos vivos)	102.816
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	15,09
Mortalidad general (número de defunciones)	34.373
<b>Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)</b>	<b>5,04</b>
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	5,3
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	4,8
Mortalidad materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	21,40
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	7,1
Mortalidad neonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	5,0
Mortalidad postneonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2,1
Razón de mortalidad menores de 5 Años	8,14
Porcentaje de defunciones por "Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos"	1,64
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2009)	6,30
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2009)	14,42
<b>Años de vida potencial perdidos</b>	<b>455.525</b>
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	68
<b>Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS (2010):</b>	
Gestantes (mal nutrición por déficit)	6,72
Gestantes (mal nutrición por exceso)	53,92
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	3,31
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	29,88
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	10,46
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	49,96
Indicadores de acceso a la atención (2009-2010)	
<b>Atención de hospitalización, sector público y privado</b>	
Camas de hospitalización	14.796
Número de egresos hospitalarios	620.801
<b>Atención ambulatoria otorgada por el SNS</b>	
<b>Consultas médicas según nivel o instancia de la atención</b>	
Total	16.186.441
Atención primaria	6.317.813
Atención de especialidades	2.986.101
Atención de urgencia	6.882.527
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	69,00
<b>Cobertura de inmunizaciones</b>	
BCG (recién nacido)	95,8
Pentavalente (3a. dosis)	92,7
Trivírica (12 meses)	84,6

Algunos indicadores de mortalidad por causa, según sexo. 2009		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Todas las causas</b>	<b>34.373</b>	<b>504,4</b>
Hombres	17.757	534,2
Mujeres	16.616	476,1
<b>Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)</b>	<b>8.644</b>	<b>126,8</b>
Hombres	4.379	131,7
Mujeres	4.265	122,2
<b>Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)</b>	<b>9.453</b>	<b>138,7</b>
Hombres	4.541	136,6
Mujeres	4.912	140,7
<b>Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)</b>	<b>3.091</b>	<b>45,4</b>
Hombres	1.563	47,0
Mujeres	1.528	43,8
<b>Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)</b>	<b>2.499</b>	<b>36,7</b>
Hombres	1.513	45,5
Mujeres	986	28,3
<b>Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)</b>	<b>2.870</b>	<b>42,1</b>
Hombres	2.149	64,7
Mujeres	721	20,7
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)</b>	<b>2.623</b>	<b>38,5</b>
Hombres	1.553	46,7
Mujeres	1.070	30,7
<b>Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)</b>	<b>2.926</b>	<b>42,9</b>
Hombres	1.321	39,7
Mujeres	1.605	46,0
<b>Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)</b>	<b>1.413</b>	<b>20,7</b>
Hombres	708	21,3
Mujeres	705	20,2
<b>Neumonía (CIE-10: J12-J18)</b>	<b>1.068</b>	<b>15,7</b>
Hombres	491	14,8
Mujeres	577	16,5
<b>Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)</b>	<b>1.512</b>	<b>22,2</b>
Hombres	1.038	31,2
Mujeres	474	13,6
<b>Ciertos accidentes de transporte terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)</b>	<b>671</b>	<b>9,9</b>
Hombres	518	15,6
Mujeres	153	4,4
<b>Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)</b>	<b>787</b>	<b>11,6</b>
Hombres	603	18,1
Mujeres	184	5,3
<b>VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)</b>	<b>196</b>	<b>2,9</b>
Hombres	172	5,2
Mujeres	24	0,7
<b>Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)</b>	<b>84</b>	<b>1,2</b>
Hombres	62	1,9
Mujeres	22	0,6


\*Tasa por 100.000 habitantes

## Región Metropolitana de Santiago: Indicadores Básicos

Metropolitana de Santiago: Población Estimada al 30 de Junio de 2011,  
por Grupos Quinquenales de Edad y Sexo.



Defunciones por grandes grupos de causa de muerte.  
Región Metropolitana de Santiago, 2009



# Región del Libertador Bernardo O'Higgins: Indicadores Básicos


Indicadores demográficos (2011)	
<b>Población (ambos sexos)</b>	<b>891.763</b>
Hombres	449.700
Mujeres	442.063
Índice de masculinidad	101,73
<b>Esperanza de vida</b>	
Hombres	74,95
Mujeres	80,22
Porcentaje de población de menores de 15 años	22,15
Porcentaje de población de 65 y más años	9,42
Indicadores de Estadísticas Vitales (2009)	
Natalidad (número de nacidos vivos)	12.771
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	14,60
Mortalidad general (número de defunciones)	4.720
<b>Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)</b>	<b>5,40</b>
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,0
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	4,8
Mortalidad materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	7,83
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	7,6
Mortalidad neonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	5,5
Mortalidad postneonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2,1
Razón de mortalidad menores de 5 Años	8,46
Porcentaje de defunciones por "Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos"	3,14
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2009)	5,42
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2009)	16,83
<b>Años de vida potencial perdidos</b>	<b>65.920</b>
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	77
<b>Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS (2010):</b>	
Gestantes (mal nutrición por déficit)	6,05
Gestantes (mal nutrición por exceso)	57,91
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,93
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	32,54
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	9,91
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	51,26
Indicadores de acceso a la atención (2009-2010)	
<b>Atención de hospitalización, sector público y privado</b>	
Camas de hospitalización	1.045
Número de egresos hospitalarios	74.927
<b>Atención ambulatoria otorgada por el SNS</b>	
<b>Consultas médicas según nivel o instancia de la atención</b>	
Total	2.044.940
Atención primaria	961.678
Atención de especialidades	254.670
Atención de urgencia	828.592
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	43,91
<b>Cobertura de inmunizaciones</b>	
BCG (recién nacido)	100,0
Pentavalente (3a. dosis)	99,0
Trivírica (12 meses)	87,6

Algunos indicadores de mortalidad por causa, según sexo. 2009		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Todas las causas</b>	<b>4.720</b>	<b>539,6</b>
Hombres	2.654	601,6
Mujeres	2.066	476,5
<b>Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)</b>	<b>1.113</b>	<b>127,2</b>
Hombres	631	143,0
Mujeres	482	111,2
<b>Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)</b>	<b>1.207</b>	<b>138,0</b>
Hombres	623	141,2
Mujeres	584	134,7
<b>Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)</b>	<b>486</b>	<b>55,6</b>
Hombres	239	54,2
Mujeres	247	57,0
<b>Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)</b>	<b>408</b>	<b>46,6</b>
Hombres	267	60,5
Mujeres	141	32,5
<b>Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)</b>	<b>434</b>	<b>49,6</b>
Hombres	357	80,9
Mujeres	77	17,8
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)</b>	<b>375</b>	<b>42,9</b>
Hombres	223	50,5
Mujeres	152	35,1
<b>Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)</b>	<b>378</b>	<b>43,2</b>
Hombres	188	42,6
Mujeres	190	43,8
<b>Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)</b>	<b>186</b>	<b>21,3</b>
Hombres	96	21,8
Mujeres	90	20,8
<b>Neumonía (CIE-10: J12-J18)</b>	<b>224</b>	<b>25,6</b>
Hombres	106	24,0
Mujeres	118	27,2
<b>Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)</b>	<b>260</b>	<b>29,7</b>
Hombres	188	42,6
Mujeres	72	16,6
<b>Ciertos accidentes de transporte terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)</b>	<b>139</b>	<b>15,9</b>
Hombres	116	26,3
Mujeres	23	5,3
<b>Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)</b>	<b>111</b>	<b>12,7</b>
Hombres	99	22,4
Mujeres	12	2,8
<b>VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)</b>	<b>21</b>	<b>2,4</b>
Hombres	18	4,1
Mujeres	3	0,7
<b>Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)</b>	<b>7</b>	<b>0,8</b>
Hombres	6	1,4
Mujeres	1	0,2


\*Tasa por 100.000 habitantes

## Región del Libertador Bernardo O'Higgins: Indicadores Básicos

Libertador Bernardo O'Higgins: Población Estimada al 30 de Junio de 2011,  
por Grupos Quinquenales de Edad y Sexo.



Defunciones por grandes grupos de causa de muerte.  
Región del Libertador Bernardo O'Higgins, 2009



## Región del Maule: Indicadores Básicos


Indicadores demográficos (2011)	
<b>Población (ambos sexos)</b>	<b>1.015.763</b>
Hombres	505.737
Mujeres	510.026
Índice de masculinidad	99,16
<b>Esperanza de vida</b>	
Hombres	74,37
Mujeres	79,77
Porcentaje de población de menores de 15 años	22,02
Porcentaje de población de 65 y más años	9,55
Indicadores de Estadísticas Vitales (2009)	
Natalidad (número de nacidos vivos)	14.208
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	14,21
Mortalidad general (número de defunciones)	5.917
<b>Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)</b>	<b>5,92</b>
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,7
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,1
Mortalidad materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	14,08
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	7,6
Mortalidad neonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	4,8
Mortalidad postneonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2,8
Razón de mortalidad menores de 5 Años	9,36
Porcentaje de defunciones por "Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos"	1,84
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2009)	5,20
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2009)	17,03
<b>Años de vida potencial perdidos</b>	<b>81.259</b>
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	83
<b>Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS (2010):</b>	
Gestantes (mal nutrición por déficit)	5,16
Gestantes (mal nutrición por exceso)	59,72
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,52
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	32,54
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	10,13
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	50,44
Indicadores de acceso a la atención (2009-2010)	
<b>Atención de hospitalización, sector público y privado</b>	
Camas de hospitalización	1.571
Número de egresos hospitalarios	91.774
<b>Atención ambulatoria otorgada por el SNS</b>	
<b>Consultas médicas según nivel o instancia de la atención</b>	
Total	2.404.975
Atención primaria	878.087
Atención de especialidades	327.960
Atención de urgencia	1.198.928
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	70,08
<b>Cobertura de inmunizaciones</b>	
BCG (recién nacido)	100,0
Pentavalente (3a. dosis)	96,8
Trivárica (12 meses)	95,4

Algunos indicadores de mortalidad por causa, según sexo. 2009		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Todas las causas</b>	<b>5.917</b>	<b>591,9</b>
Hombres	3.337	669,8
Mujeres	2.580	514,5
<b>Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)</b>	<b>1.397</b>	<b>139,7</b>
Hombres	732	146,9
Mujeres	665	132,6
<b>Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)</b>	<b>1.667</b>	<b>166,8</b>
Hombres	899	180,5
Mujeres	768	153,2
<b>Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)</b>	<b>639</b>	<b>63,9</b>
Hombres	338	67,8
Mujeres	301	60,0
<b>Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)</b>	<b>412</b>	<b>41,2</b>
Hombres	259	52,0
Mujeres	153	30,5
<b>Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)</b>	<b>643</b>	<b>64,3</b>
Hombres	513	103,0
Mujeres	130	25,9
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)</b>	<b>486</b>	<b>48,6</b>
Hombres	321	64,4
Mujeres	165	32,9
<b>Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)</b>	<b>543</b>	<b>54,3</b>
Hombres	283	56,8
Mujeres	260	51,9
<b>Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)</b>	<b>196</b>	<b>19,6</b>
Hombres	105	21,1
Mujeres	91	18,2
<b>Neumonía (CIE-10: J12-J18)</b>	<b>319</b>	<b>31,9</b>
Hombres	165	33,1
Mujeres	154	30,7
<b>Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)</b>	<b>247</b>	<b>24,7</b>
Hombres	182	36,5
Mujeres	65	13,0
<b>Ciertos accidentes de transporte terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)</b>	<b>184</b>	<b>18,4</b>
Hombres	148	29,7
Mujeres	36	7,2
<b>Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)</b>	<b>150</b>	<b>15,0</b>
Hombres	122	24,5
Mujeres	28	5,6
<b>VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)</b>	<b>29</b>	<b>2,9</b>
Hombres	23	4,6
Mujeres	6	1,2
<b>Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)</b>	<b>8</b>	<b>0,8</b>
Hombres	4	0,8
Mujeres	4	0,8


\*Tasa por 100.000 habitantes

## Región del Maule: Indicadores Básicos

Del Maule: Población Estimada al 30 de Junio de 2011,  
por Grupos Quinquenales de Edad y Sexo.



Defunciones por grandes grupos de causa de muerte.  
Región del Maule, 2009





## Región del BíoBío: Indicadores Básicos


Indicadores demográficos (2011)	
<b>Población (ambos sexos)</b>	<b>2.048.993</b>
Hombres	1.009.665
Mujeres	1.039.328
Índice de masculinidad	97,15
<b>Esperanza de vida</b>	
Hombres	74,13
Mujeres	80,64
Porcentaje de población de menores de 15 años	21,81
Porcentaje de población de 65 y más años	9,48
Indicadores de Estadísticas Vitales (2009)	
Natalidad (número de nacidos vivos)	28.459
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	14,07
Mortalidad general (número de defunciones)	11.750
<b>Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)</b>	<b>5,81</b>
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,6
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,0
Mortalidad materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	17,57
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	8,7
Mortalidad neonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	5,7
Mortalidad postneonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	3,0
Razón de mortalidad menores de 5 Años	10,33
Porcentaje de defunciones por "Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos"	1,99
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2009)	5,52
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2009)	16,36
<b>Años de vida potencial perdidos</b>	<b>167.758</b>
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	84
<b>Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS (2010):</b>	
Gestantes (mal nutrición por déficit)	5,65
Gestantes (mal nutrición por exceso)	57,36
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,61
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	34,28
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	9,06
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	53,46
Indicadores de acceso a la atención (2009-2010)	
<b>Atención de hospitalización, sector público y privado</b>	
Camas de hospitalización	4.119
Número de egresos hospitalarios	227.723
<b>Atención ambulatoria otorgada por el SNS</b>	
<b>Consultas médicas según nivel o instancia de la atención</b>	
Total	5.852.266
Atención primaria	2.319.322
Atención de especialidades	922.594
Atención de urgencia	2.610.350
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	80,50
<b>Cobertura de inmunizaciones</b>	
BCG (recién nacido)	93,2
Pentavalente (3a. dosis)	93,0
Trivírica (12 meses)	90,8

Algunos indicadores de mortalidad por causa, según sexo. 2009		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Todas las causas</b>	<b>11.750</b>	<b>580,8</b>
Hombres	6.575	659,3
Mujeres	5.175	504,5
<b>Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)</b>	<b>2.840</b>	<b>140,4</b>
Hombres	1.449	145,3
Mujeres	1.391	135,6
<b>Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)</b>	<b>3.174</b>	<b>156,9</b>
Hombres	1.704	170,9
Mujeres	1.470	143,3
<b>Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)</b>	<b>1.119</b>	<b>55,3</b>
Hombres	579	58,1
Mujeres	540	52,7
<b>Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)</b>	<b>1.080</b>	<b>53,4</b>
Hombres	736	73,8
Mujeres	344	33,5
<b>Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)</b>	<b>1.115</b>	<b>55,1</b>
Hombres	884	88,6
Mujeres	231	22,5
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)</b>	<b>884</b>	<b>43,7</b>
Hombres	553	55,5
Mujeres	331	32,3
<b>Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)</b>	<b>1.211</b>	<b>59,9</b>
Hombres	621	62,3
Mujeres	590	57,5
<b>Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)</b>	<b>413</b>	<b>20,4</b>
Hombres	203	20,4
Mujeres	210	20,5
<b>Neumonía (CIE-10: J12-J18)</b>	<b>500</b>	<b>24,7</b>
Hombres	267	26,8
Mujeres	233	22,7
<b>Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)</b>	<b>740</b>	<b>36,6</b>
Hombres	564	56,6
Mujeres	176	17,2
<b>Ciertos accidentes de transporte terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)</b>	<b>315</b>	<b>15,6</b>
Hombres	249	25,0
Mujeres	66	6,4
<b>Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)</b>	<b>270</b>	<b>13,4</b>
Hombres	227	22,8
Mujeres	43	4,2
<b>VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)</b>	<b>36</b>	<b>1,8</b>
Hombres	30	3,0
Mujeres	6	0,6
<b>Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)</b>	<b>34</b>	<b>1,7</b>
Hombres	25	2,5
Mujeres	9	0,9


\*Tasa por 100.000 habitantes

## Región del BíoBío: Indicadores Básicos

Del BíoBío: Población Estimada al 30 de Junio de 2011,  
por Grupos Quinquenales de Edad y Sexo.



Defunciones por grandes grupos de causa de muerte.  
Región del BíoBío, 2009



## Región de La Araucanía: Indicadores Básicos


Indicadores demográficos (2011)	
<b>Población (ambos sexos)</b>	<b>978.402</b>
Hombres	484.727
Mujeres	493.675
Índice de masculinidad	98,19
<b>Esperanza de vida</b>	
Hombres	74,48
Mujeres	80,51
Porcentaje de población de menores de 15 años	23,04
Porcentaje de población de 65 y más años	9,89
Indicadores de Estadísticas Vitales (2009)	
Natalidad (número de nacidos vivos)	13.617
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	14,15
Mortalidad general (número de defunciones)	5.823
<b>Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)</b>	<b>6,05</b>
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,7
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,4
Mortalidad materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	29,38
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	8,7
Mortalidad neonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	5,8
Mortalidad postneonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2,9
Razón de mortalidad menores de 5 Años	10,50
Porcentaje de defunciones por "Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos"	6,59
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2009)	5,31
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2009)	18,97
<b>Años de vida potencial perdidos</b>	<b>77.559</b>
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	82
<b>Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS (2010):</b>	
Gestantes (mal nutrición por déficit)	5,02
Gestantes (mal nutrición por exceso)	58,73
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,39
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	37,58
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	8,85
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	52,71
Indicadores de acceso a la atención (2009-2010)	
<b>Atención de hospitalización, sector público y privado</b>	
Camas de hospitalización	2.312
Número de egresos hospitalarios	103.798
<b>Atención ambulatoria otorgada por el SNS</b>	
<b>Consultas médicas según nivel o instancia de la atención</b>	
Total	2.413.893
Atención primaria	1.022.706
Atención de especialidades	319.628
Atención de urgencia	1.071.559
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	72,05
<b>Cobertura de inmunizaciones</b>	
BCG (recién nacido)	90,2
Pentavalente (3a. dosis)	86,9
Trivírica (12 meses)	80,4

Algunos indicadores de mortalidad por causa, según sexo. 2009		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Todas las causas</b>	<b>5.823</b>	<b>605,2</b>
Hombres	3.206	672,2
Mujeres	2.617	539,4
<b>Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)</b>	<b>1.413</b>	<b>146,9</b>
Hombres	715	149,9
Mujeres	698	143,9
<b>Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)</b>	<b>1.407</b>	<b>146,2</b>
Hombres	744	156,0
Mujeres	663	136,7
<b>Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)</b>	<b>645</b>	<b>67,0</b>
Hombres	324	67,9
Mujeres	321	66,2
<b>Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)</b>	<b>316</b>	<b>32,8</b>
Hombres	207	43,4
Mujeres	109	22,5
<b>Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)</b>	<b>566</b>	<b>58,8</b>
Hombres	483	101,3
Mujeres	83	17,1
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)</b>	<b>370</b>	<b>38,5</b>
Hombres	204	42,8
Mujeres	166	34,2
<b>Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)</b>	<b>550</b>	<b>57,2</b>
Hombres	295	61,9
Mujeres	255	52,6
<b>Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)</b>	<b>145</b>	<b>15,1</b>
Hombres	71	14,9
Mujeres	74	15,3
<b>Neumonía (CIE-10: J12-J18)</b>	<b>278</b>	<b>28,9</b>
Hombres	144	30,2
Mujeres	134	27,6
<b>Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)</b>	<b>174</b>	<b>18,1</b>
Hombres	132	27,7
Mujeres	42	8,7
<b>Ciertos accidentes de transporte terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)</b>	<b>159</b>	<b>16,5</b>
Hombres	132	27,7
Mujeres	27	5,6
<b>Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)</b>	<b>133</b>	<b>13,8</b>
Hombres	123	25,8
Mujeres	10	2,1
<b>VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)</b>	<b>6</b>	<b>0,6</b>
Hombres	5	1,1
Mujeres	1	0,2
<b>Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)</b>	<b>12</b>	<b>1,3</b>
Hombres	9	1,9
Mujeres	3	0,6


\*Tasa por 100.000 habitantes

## Región de La Araucanía: Indicadores Básicos

De La Araucanía: Población Estimada al 30 de Junio de 2011,  
por Grupos Quinquenales de Edad y Sexo.



Defunciones por grandes grupos de causa de muerte.  
Región de La Araucanía, 2009



## Región de Los Ríos: Indicadores Básicos


Indicadores demográficos (2011)	
<b>Población (ambos sexos)</b>	<b>380.707</b>
Hombres	189.803
Mujeres	190.904
Índice de masculinidad	99,42
<b>Esperanza de vida</b>	
Hombres	74,15
Mujeres	80,60
Porcentaje de población de menores de 15 años	21,94
Porcentaje de población de 65 y más años	10,22
Indicadores de Estadísticas Vitales (2009)	
Natalidad (número de nacidos vivos)	5.376
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	14,21
Mortalidad general (número de defunciones)	2.469
<b>Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)</b>	<b>6,53</b>
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	7,4
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,6
Mortalidad materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	18,60
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	6,5
Mortalidad neonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	3,7
Mortalidad postneonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2,8
Razón de mortalidad menores de 5 Años	8,37
Porcentaje de defunciones por "Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos"	5,10
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2009)	4,99
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2009)	21,01
<b>Años de vida potencial perdidos</b>	<b>32.788</b>
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	88
<b>Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS (2010):</b>	
Gestantes (mal nutrición por déficit)	4,64
Gestantes (mal nutrición por exceso)	54,45
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,76
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	38,81
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	6,19
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	59,27
Indicadores de acceso a la atención (2009-2010)	
<b>Atención de hospitalización, sector público y privado</b>	
Camas de hospitalización	1.512
Número de egresos hospitalarios	45.663
<b>Atención ambulatoria otorgada por el SNS</b>	
<b>Consultas médicas según nivel o instancia de la atención</b>	
Total	1.129.032
Atención primaria	353.191
Atención de especialidades	184.957
Atención de urgencia	590.884
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	84,36
<b>Cobertura de inmunizaciones</b>	
BCG (recién nacido)	96,0
Pentavalente (3a. dosis)	89,4
Trivírica (12 meses)	79,7

Algunos indicadores de mortalidad por causa, según sexo. 2009		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Todas las causas</b>	<b>2.469</b>	<b>652,8</b>
Hombres	1.406	744,5
Mujeres	1.063	561,4
<b>Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)</b>	<b>584</b>	<b>154,4</b>
Hombres	308	163,1
Mujeres	276	145,8
<b>Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)</b>	<b>626</b>	<b>165,5</b>
Hombres	361	191,2
Mujeres	265	140,0
<b>Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)</b>	<b>300</b>	<b>79,3</b>
Hombres	153	81,0
Mujeres	147	77,6
<b>Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)</b>	<b>153</b>	<b>40,5</b>
Hombres	99	52,4
Mujeres	54	28,5
<b>Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)</b>	<b>260</b>	<b>68,8</b>
Hombres	217	114,9
Mujeres	43	22,7
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)</b>	<b>179</b>	<b>47,3</b>
Hombres	108	57,2
Mujeres	71	37,5
<b>Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)</b>	<b>201</b>	<b>53,2</b>
Hombres	115	60,9
Mujeres	86	45,4
<b>Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)</b>	<b>71</b>	<b>18,8</b>
Hombres	26	13,8
Mujeres	45	23,8
<b>Neumonía (CIE-10: J12-J18)</b>	<b>158</b>	<b>41,8</b>
Hombres	86	45,5
Mujeres	72	38,0
<b>Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)</b>	<b>93</b>	<b>24,6</b>
Hombres	67	35,5
Mujeres	26	13,7
<b>Ciertos accidentes de transporte terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)</b>	<b>61</b>	<b>16,1</b>
Hombres	54	28,6
Mujeres	7	3,7
<b>Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)</b>	<b>80</b>	<b>21,2</b>
Hombres	67	35,5
Mujeres	13	6,9
<b>VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)</b>	<b>5</b>	<b>1,3</b>
Hombres	5	2,7
Mujeres	0	0,0
<b>Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)</b>	<b>9</b>	<b>2,4</b>
Hombres	6	3,2
Mujeres	3	1,6


\*Tasa por 100.000 habitantes

## Región de Los Ríos: Indicadores Básicos

De Los Ríos: Población Estimada al 30 de Junio de 2011,  
por Grupos Quinquenales de Edad y Sexo.



Defunciones por grandes grupos de causa de muerte.  
Región de Los Ríos, 2009



# Región de Los Lagos: Indicadores Básicos


Indicadores demográficos (2011)	
<b>Población (ambos sexos)</b>	<b>846.614</b>
Hombres	430.186
Mujeres	416.428
Índice de masculinidad	103,30
<b>Esperanza de vida</b>	
Hombres	73,24
Mujeres	80,19
Porcentaje de población de menores de 15 años	23,05
Porcentaje de población de 65 y más años	8,74
Indicadores de Estadísticas Vitales (2009)	
Natalidad (número de nacidos vivos)	13.158
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	15,93
Mortalidad general (número de defunciones)	4.753
<b>Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)</b>	<b>5,76</b>
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,2
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,2
Mortalidad materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	15,20
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	8,7
Mortalidad neonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	5,9
Mortalidad postneonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2,8
Razón de mortalidad menores de 5 Años	10,49
Porcentaje de defunciones por "Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos"	4,78
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2009)	5,62
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2009)	18,86
<b>Años de vida potencial perdidos</b>	<b>74.666</b>
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	92
<b>Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS (2010):</b>	
Gestantes (mal nutrición por déficit)	4,45
Gestantes (mal nutrición por exceso)	55,48
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,36
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	39,07
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	8,46
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	56,96
Indicadores de acceso a la atención (2009-2010)	
<b>Atención de hospitalización, sector público y privado</b>	
Camas de hospitalización	995
Número de egresos hospitalarios	75.732
<b>Atención ambulatoria otorgada por el SNS</b>	
<b>Consultas médicas según nivel o instancia de la atención</b>	
Total	2.261.143
Atención primaria	859.720
Atención de especialidades	369.385
Atención de urgencia	1.032.038
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	95,61
<b>Cobertura de inmunizaciones</b>	
BCG (recién nacido)	92,2
Pentavalente (3a. dosis)	91,1
Trivírica (12 meses)	100,0

Algunos indicadores de mortalidad por causa, según sexo. 2009		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Todas las causas</b>	<b>4.753</b>	<b>575,5</b>
Hombres	2.619	624,6
Mujeres	2.134	525,0
<b>Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)</b>	<b>1.078</b>	<b>130,5</b>
Hombres	531	126,6
Mujeres	547	134,6
<b>Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)</b>	<b>1.232</b>	<b>149,2</b>
Hombres	662	157,9
Mujeres	570	140,2
<b>Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)</b>	<b>504</b>	<b>61,0</b>
Hombres	267	63,7
Mujeres	237	58,3
<b>Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)</b>	<b>317</b>	<b>38,4</b>
Hombres	198	47,2
Mujeres	119	29,3
<b>Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)</b>	<b>550</b>	<b>66,6</b>
Hombres	461	109,9
Mujeres	89	21,9
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)</b>	<b>349</b>	<b>42,3</b>
Hombres	207	49,4
Mujeres	142	34,9
<b>Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)</b>	<b>397</b>	<b>48,1</b>
Hombres	212	50,6
Mujeres	185	45,5
<b>Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)</b>	<b>157</b>	<b>19,0</b>
Hombres	74	17,7
Mujeres	83	20,4
<b>Neumonía (CIE-10: J12-J18)</b>	<b>185</b>	<b>22,4</b>
Hombres	101	24,1
Mujeres	84	20,7
<b>Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)</b>	<b>200</b>	<b>24,2</b>
Hombres	144	34,3
Mujeres	56	13,8
<b>Ciertos accidentes de transporte terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)</b>	<b>91</b>	<b>11,0</b>
Hombres	77	18,4
Mujeres	14	3,4
<b>Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)</b>	<b>127</b>	<b>15,4</b>
Hombres	108	25,8
Mujeres	19	4,7
<b>VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)</b>	<b>13</b>	<b>1,6</b>
Hombres	11	2,6
Mujeres	2	0,5
<b>Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)</b>	<b>18</b>	<b>2,2</b>
Hombres	12	2,9
Mujeres	6	1,5


\*Tasa por 100.000 habitantes

## Región de Los Lagos: Indicadores Básicos

De Los Lagos: Población Estimada al 30 de Junio de 2011,  
por Grupos Quinquenales de Edad y Sexo.



Defunciones por grandes grupos de causa de muerte.  
Región de Los Lagos, 2009





# Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo: Indicadores Básicos


Indicadores demográficos (2011)	
<b>Población (ambos sexos)</b>	<b>105.865</b>
Hombres	55.673
Mujeres	50.192
Índice de masculinidad	110,92
<b>Esperanza de vida</b>	
Hombres	74,13
Mujeres	83,60
Porcentaje de población de menores de 15 años	24,51
Porcentaje de población de 65 y más años	7,13
Indicadores de Estadísticas Vitales (2009)	
Natalidad (número de nacidos vivos)	1.697
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	16,36
Mortalidad general (número de defunciones)	529
<b>Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)</b>	<b>5,10</b>
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,1
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	4,0
Mortalidad materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	0,00
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	13,0
Mortalidad neonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	7,1
Mortalidad postneonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	5,9
Razón de mortalidad menores de 5 Años	12,96
Porcentaje de defunciones por "Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos"	3,40
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2009)	6,16
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2009)	21,34
<b>Años de vida potencial perdidos</b>	<b>9.844</b>
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	96
<b>Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS (2010):</b>	
Gestantes (mal nutrición por déficit)	3,02
Gestantes (mal nutrición por exceso)	57,55
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,27
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	41,98
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	7,39
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	61,95
Indicadores de acceso a la atención (2009-2010)	
<b>Atención de hospitalización, sector público y privado</b>	
Camas de hospitalización	262
Número de egresos hospitalarios	12.496
<b>Atención ambulatoria otorgada por el SNSS</b>	
<b>Consultas médicas según nivel o instancia de la atención</b>	
Total	325.180
Atención primaria	123.292
Atención de especialidades	53.153
Atención de urgencia	148.735
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	82,76
<b>Cobertura de inmunizaciones</b>	
BCG (recién nacido)	87,8
Pentavalente (3a. dosis)	85,9
Trivírica (12 meses)	87,3

Algunos indicadores de mortalidad por causa, según sexo. 2009		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Todas las causas</b>	<b>529</b>	<b>509,9</b>
Hombres	333	609,9
Mujeres	196	398,9
<b>Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)</b>	<b>145</b>	<b>139,8</b>
Hombres	85	155,7
Mujeres	60	122,1
<b>Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)</b>	<b>123</b>	<b>118,6</b>
Hombres	78	142,9
Mujeres	45	91,6
<b>Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)</b>	<b>42</b>	<b>40,5</b>
Hombres	24	44,0
Mujeres	18	36,6
<b>Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)</b>	<b>38</b>	<b>36,6</b>
Hombres	26	47,6
Mujeres	12	24,4
<b>Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)</b>	<b>82</b>	<b>79,1</b>
Hombres	70	128,2
Mujeres	12	24,4
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)</b>	<b>56</b>	<b>54,0</b>
Hombres	40	73,3
Mujeres	16	32,6
<b>Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)</b>	<b>37</b>	<b>35,7</b>
Hombres	23	42,1
Mujeres	14	28,5
<b>Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)</b>	<b>13</b>	<b>12,5</b>
Hombres	5	9,2
Mujeres	8	16,3
<b>Neumonía (CIE-10: J12-J18)</b>	<b>19</b>	<b>18,3</b>
Hombres	9	16,5
Mujeres	10	20,4
<b>Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)</b>	<b>28</b>	<b>27,0</b>
Hombres	20	36,6
Mujeres	8	16,3
<b>Ciertos accidentes de transporte terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)</b>	<b>12</b>	<b>11,6</b>
Hombres	10	18,3
Mujeres	2	4,1
<b>Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)</b>	<b>21</b>	<b>20,2</b>
Hombres	18	33,0
Mujeres	3	6,1
<b>VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>
Hombres	1	1,8
Mujeres	0	0,0
<b>Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)</b>	<b>5</b>	<b>4,8</b>
Hombres	1	1,8
Mujeres	4	8,1


\*Tasa por 100.000 habitantes

## Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo: Indicadores Básicos

Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo: Población Estimada al 30 de Junio de 2011, por Grupos Quinquenales de Edad y Sexo.



Defunciones por grandes grupos de causa de muerte. Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, 2009



# Región de Magallanes y de la Antártica Chilena: Indicadores Básicos


Indicadores demográficos (2011)	
<b>Población (ambos sexos)</b>	<b>159.154</b>
Hombres	83.675
Mujeres	75.479
Índice de masculinidad	110,86
<b>Esperanza de vida</b>	
Hombres	73,81
Mujeres	80,35
Porcentaje de población de menores de 15 años	20,87
Porcentaje de población de 65 y más años	8,89
Indicadores de Estadísticas Vitales (2009)	
Natalidad (número de nacidos vivos)	2.221
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	14,05
Mortalidad general (número de defunciones)	981
<b>Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)</b>	<b>6,20</b>
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,7
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,7
Mortalidad materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	45,02
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	6,8
Mortalidad neonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	4,1
Mortalidad postneonatal (tasa por 1.000 nacidos vivos)	2,7
Razón de mortalidad menores de 5 Años	7,20
Porcentaje de defunciones por "Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos"	1,33
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2009)	6,59
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2009)	15,11
<b>Años de vida potencial perdidos</b>	<b>12.813</b>
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	82
<b>Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS (2010):</b>	
Gestantes (mal nutrición por déficit)	5,11
Gestantes (mal nutrición por exceso)	60,94
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	1,63
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	37,62
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	5,66
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	65,27
Indicadores de acceso a la atención (2009-2010)	
<b>Atención de hospitalización, sector público y privado</b>	
Camas de hospitalización	294
Número de egresos hospitalarios	23.698
<b>Atención ambulatoria otorgada por el SNSS</b>	
<b>Consultas médicas según nivel o instancia de la atención</b>	
Total	421.356
Atención primaria	130.989
Atención de especialidades	84.112
Atención de urgencia	206.255
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	68,30
<b>Cobertura de inmunizaciones</b>	
BCG (recién nacido)	87,7
Pentavalente (3a. dosis)	86,1
Trivírica (12 meses)	80,4

Algunos indicadores de mortalidad por causa, según sexo. 2009		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Todas las causas</b>	<b>981</b>	<b>620,5</b>
Hombres	556	668,8
Mujeres	425	566,8
<b>Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)</b>	<b>241</b>	<b>152,4</b>
Hombres	132	158,8
Mujeres	109	145,4
<b>Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)</b>	<b>306</b>	<b>193,5</b>
Hombres	182	218,9
Mujeres	124	165,4
<b>Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)</b>	<b>86</b>	<b>54,4</b>
Hombres	47	56,5
Mujeres	39	52,0
<b>Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)</b>	<b>75</b>	<b>47,4</b>
Hombres	52	62,6
Mujeres	23	30,7
<b>Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)</b>	<b>68</b>	<b>43,0</b>
Hombres	44	52,9
Mujeres	24	32,0
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
<b>Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)</b>	<b>127</b>	<b>80,3</b>
Hombres	82	98,6
Mujeres	45	60,0
<b>Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)</b>	<b>64</b>	<b>40,5</b>
Hombres	39	46,9
Mujeres	25	33,3
<b>Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)</b>	<b>30</b>	<b>19,0</b>
Hombres	16	19,3
Mujeres	14	18,7
<b>Neumonía (CIE-10: J12-J18)</b>	<b>29</b>	<b>18,3</b>
Hombres	15	18,0
Mujeres	14	18,7
<b>Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)</b>	<b>41</b>	<b>25,9</b>
Hombres	32	38,5
Mujeres	9	12,0
<b>Ciertos accidentes de transporte terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)</b>	<b>15</b>	<b>9,5</b>
Hombres	10	12,0
Mujeres	5	6,7
<b>Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)</b>	<b>23</b>	<b>14,6</b>
Hombres	15	18,0
Mujeres	8	10,7
<b>VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)</b>	<b>1</b>	<b>0,6</b>
Hombres	1	1,2
Mujeres	0	0,0
<b>Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)</b>	<b>5</b>	<b>3,2</b>
Hombres	3	3,6
Mujeres	2	2,7


\*Tasa por 100.000 habitantes

## Región de Magallanes y de la Antártica Chilena: Indicadores Básicos

Magallanes y de la Antártica Chilena: Población Estimada al 30 de Junio de 2011,  
por Grupos Quinquenales de Edad y Sexo.



Defunciones por grandes grupos de causa de muerte.  
Región de Magallanes y la Antártica Chilena, 2009



## Notas técnicas

### Atención profesional del parto:

Proporción de nacidos vivos que nacieron de un parto atendido por un profesional de la salud (médico ó matrona) en relación al total de nacidos vivos. Excluye los partos que dieron origen a nacidos muertos.

### Años de vida potencial perdidos:

Indicador derivado de los datos de mortalidad, que muestra el impacto relativo de varias enfermedades y problemas de salud en la sociedad, que ilustran sobre las pérdidas que sufre la sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de fallecimientos prematuros. Se considera que una muerte es prematura cuando ocurre antes de cierta edad predeterminada (80 años edad).

La tasa de AVPP se informa por cada mil habitantes de 0 a 79 años.

### Cama hospitalaria:

Es aquella que se encuentra instalada y dispuesta las 24 horas del día para uso regular de pacientes hospitalizados.

Se cuentan como camas de hospital, las camas de adultos y niños (cunas e incubadoras usadas para el tratamiento de niños hospitalizados), camas críticas, etc.

No son camas de hospital las que se usan sólo temporalmente con fines de diagnóstico o tratamiento (radiología e imagenología, camas de parto y de trabajo de parto, pruebas de metabolismo basal, camas de recuperación post operatoria, camas para realizar Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), camillas ubicadas en salas de emergencia donde el paciente espera su atención definitiva), cunas de recién nacidos sanos que se encuentran instaladas junto a la cama de la madre, destinadas al cuidado del recién nacido hasta el alta del parto, camas de acompañantes, camas para el personal, etc.

### Cobertura de inmunizaciones:

Es el cociente entre el número de individuos vacunados según su edad y el total de individuos en la población que ameritaron recibir la vacuna en un territorio determinado. Este cociente oscila entre 0 y 1, aunque expresado en términos porcentuales, indica cuántos individuos están vacunados por cada 100 integrantes de la población objetivo.

La población objetivo de BCG son los recién nacidos, para la vacunación Pentavalente son los menores de un año y para la Trivírica es la población de un año de edad.

### Concentración de atenciones médicas ambulatorias otorgadas por el SNSS por habitante:

Incluye controles y consultas otorgados por personal médico en el primer nivel de la atención, en atención de especialidades y en servicios de urgencia del Sistema Nacional de Servicios de Salud. La cifra es una razón entre las atenciones y la población total del país e informa el número de atenciones por habitante. Excluye las atenciones proporcionadas por otros prestadores (privados e institucionales).

### Defunciones por síntomas, signos y hallazgos anormales:

Proporción de defunciones registradas en el Capítulo XVIII “Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte” de la “Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud” Décima Revisión, (CIE-10), en relación con el total de defunciones. Cabe señalar que lo que se informa no son las defunciones registradas por estas causas, sino las que quedaron asignadas a ese capítulo después de la revisión y corrección de la información a través del sistema de validación y reparos vigente.

### Enfermedad de declaración obligatoria:

Enfermedad que por requerimientos legales debe ser informada a las autoridades de salud pública, por los médicos cirujanos o por otros profesionales de la salud que atienden al enfermo que la padece.

### Índice de masculinidad:

Es una cifra que señala la proporción de hombres por cada 100 mujeres que hay en un territorio.

### Mortalidad general:

Es la razón entre el número de muertes ocurridas en un territorio y la cantidad de habitantes de dicha área en un año dado. Se calcula como el cociente entre el número de defunciones ocurridas durante cada año (numerador) y la población promedio estimada para el mismo año, multiplicado por mil. La cifra se informa, por lo tanto, por cada mil habitantes.

### Mortalidad infantil:

La mortalidad infantil expresa el riesgo de morir de los nacidos durante su primer año de vida. Se calcula como el cociente entre el número de defunciones de menores de un año en un territorio y el número de nacidos vivos de madres residentes en el mismo, para un período dado. La cifra se informa por cada mil nacidos vivos.

### Mortalidad materna:

Razón entre el número de defunciones maternas por cada cien mil nacidos vivos en el mismo período.

**Defunción Materna:** es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes al término del embarazo, independientemente de la duración y del sitio del mismo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o por su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

### Mortalidad neonatal:

Número de defunciones de menores de 28 días ocurridas en un territorio por cada mil nacidos vivos en el mismo para un período dado.

#### **Mortalidad por causa:**

Número de defunciones debidas a determinada causa o grupo de causas de muerte ocurridas en un territorio por cada 100.000 habitantes del mismo.

#### **Mortalidad postneonatal:**

Número de defunciones de niños de 28 días a 11 meses de edad ocurridas en un territorio por cada mil nacidos vivos en el mismo para un período dado.

#### **Nacidos vivos con bajo peso al nacer:**

Proporción (por 100) de nacidos vivos cuya primera medición del peso realizada después del nacimiento, resulta inferior a 2.500 gramos.

#### **Nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad:**

Proporción (por 100) de nacidos vivos de madres menores de 20 años, indicador que aporta información acerca de un grupo de edad en el que la maternidad presenta riesgos mayores que en los demás, afectando tanto a las madres, como a los recién nacidos.

#### **Natalidad:**

Número de nacidos vivos ocurridos en un territorio por cada mil habitantes del mismo, en un período dado.

#### **Prevalencia de malnutrición en población en control en establecimientos del SNSS:**

Se mide utilizando diferentes patrones de referencia según el grupo de población controlado:

**Embarazadas:** El estado nutricional de las embarazadas se mide sobre la base de una curva nacional<sup>1</sup> que considera el indicador de peso para la talla y el incremento según semanas de gestación. La malnutrición por déficit considera a las embarazadas de bajo peso y la malnutrición por exceso incluye a las con sobrepeso y a las obesas.

**Menores de 6 años:** Se conjuga indicadores de Peso para la Edad, Peso para la Talla y Talla para la Edad, utilizando el patrón de referencia NCHS, más datos anamnésticos, genéticos y otros. La malnutrición por déficit considera a los niños en riesgo de desnutrir, desnutridos y con desnutrición secundaria y la malnutrición por exceso incluye a los niños con sobrepeso y a los obesos.

**Adultos mayores:** El estado nutricional se mide según el Índice de Masa Corporal (IMC= Peso/Talla). La malnutrición por déficit considera a los adultos de 65 y más años de bajo peso y la malnutrición por exceso incluye a los con sobrepeso y a los obesos.

#### **Razón de altas odontológicas otorgadas por el SNSS por mil habitantes:**

Incluye las altas integrales que corresponden al número de pacientes que han terminado su tratamiento de odontología general en la Atención Primaria de Salud, cumpliendo las etapas de examen, diagnóstico, entrega de refuerzo educativo, prevención específica, recuperación y de apoyo que sean pertinentes y el número de pacientes que han terminado su tratamiento de odontología de especialidad. La cifra se expresa por mil habitantes.

#### **Razón de mortalidad de menores de 5 años:**

Número de defunciones de menores de 5 años ocurridas en un territorio en un período dado, por cada 1.000 nacidos vivos. Es una aproximación a la probabilidad de morir antes de cumplir los 5 años de edad.

#### **Tasa global de fecundidad:**

Número medio de hijos por mujer al término de su vida fértil.

#### **Tasas ajustadas<sup>2</sup> de mortalidad:**

Obtenidas por estandarización directa, aplicando las tasas de mortalidad específicas por edad correspondientes, para un determinado sexo y grupo de causas de defunción, a la población de Chile del Censo 1992.

#### **FUENTES DE DATOS**

**CNEV:** Comité Nacional de Estadísticas Vitales, integrado por el Ministerio de Salud, el Servicio de Registro Civil e Identificación y el Instituto Nacional de Estadísticas.

**DEIS, MINSAL:** Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud.

**INE:** Instituto Nacional de Estadísticas, responsable de las estadísticas oficiales del país.

**ONU:** Informe Mundial de Desarrollo Humano.

<sup>1</sup> Rosso, P., Mardones, F. Curva Patrón de Incrementos Ponderales Durante el Embarazo. Ministerio de Salud de Chile y UNICEF. Santiago: 1987.

<sup>2</sup> El ajuste de las tasas de mortalidad por edad se realiza para eliminar el efecto de la composición por edad de la población sobre la magnitud de la mortalidad, validando de esta manera la comparación entre mortalidades de distintos años.



**Departamento de Estadísticas e Información de Salud**  
**[www.deis.cl](http://www.deis.cl)**

