

Estudio de Mortalidad

Evolución de la Mortalidad en Quillota 1999 - 2008

Todos los valores señalados en el siguiente estudio, son referencias oficiales del DEIS MINSAL e INE, y cálculos epidemiológicos a partir de los mismos.

Conclusiones

Quillota posee una Población Envejecida, lo que determina características particulares referente a su mortalidad.

Las personas fallecen a edades avanzadas, sin un riesgo de fallecer aumentado.

La mortalidad Infantil mantiene un descenso progresivo, la prematuridad y anomalías congénitas son las principales causas.

Conclusiones

En la niñez se mantienen tasas de mortalidad bajas, siendo las principales causas las consecuencias de malformaciones congénitas y prematuridad.

Los adolescentes que fallecen han ido disminuyendo, las altas guardan relación con el suicidio y los accidentes.

Conclusiones

La mortalidad en adultos con descenso progresivo, aumentada en los últimos años en el grupo de hombres entre 45 -64 años a expensas de patología cardiovascular.

Los adultos mayores no han experimentado mayores cambios en su perfil de mortalidad en el transcurso de 10 años.

Conclusiones

Para el 2009 las principales causas de mortalidad fueron lo cardiovascular, lo neoplásico y lo respiratorio , al igual que en el resto del país.

El 44% y el 39% de las mujeres y hombres respectivamente fallecen por sobre las expectativas de vida del país.

Conclusiones

Los hombres que fallecen cuando no debiesen fallecer, lo hacen, en su mayoría, sobre los 40 años, secundario a Enf. Cardiovascular, cánceres y Traumas.

Las mujeres que fallecen cuando no debiesen fallecer, lo hacen, en su mayoría, sobre los 70 años, secundario a Cánceres, Enf. Cardiovasculares y Digestivas.

DEMOGRAFÍA

1999

10

2008



75.803 hbt

Crecimiento poblacional

12,3%

85.198 hbt

D
E
M
O
G
R
A
F
I
A



DEMOGRAFÍA

1999

10

2008

Cambio Poblacionales:

Progresiva

Regresiva

Madura

Vieja



Menor población dependiente

Población activa más envejecida

D
E
M
O
G
R
A
F
Í
A

Índices	1999		2008	
	Valor		Valor	
Friz	128,7014		113,1099	
Sundborg	51,6068	39,6562	42,0701	48,1889
Burgdöfer	18,5204	18,0255	15,2198	22,4336
Envejecimiento	31,649		44,9971	
Dependencia	55,0909		47,1926	
Estructura de la población activa	64,3797		75,9492	
Reemplazamiento de la población activa	35,4401		47,6765	
Índice generacional de ancianos	388,0371		361,1301	
Edad media	31,7315		34,3461	

Perfil Histórico Tasas de Mortalidad




1999

2008

Describir evolución y Comparar con Chile

MORTALIDAD GENERAL QUILLOTA




Mortalidad estable, tendencia al descenso progresivo
Hombres > Mujeres
Tendencia a disminuir las diferencias a partir 2004

Años de mortalidad más baja

QUILLOTA			
Mortalidad General			
	Ambos Sexos	Hombres	Mujeres
AÑO	Defunciones		
1999	522	285	237
2000	528	281	247
2001	508	274	234
2002	511	286	225
2003	498	275	223
2004	534	273	261
2005	544	285	259
2006	525	293	232
2007	573	295	278
2008	551	286	265


M
O
R
T
A
L
I
D
A
D
G
E
N
E
R
A
L

MORTALIDAD BRUTA GENERAL




Siempre la mortalidad por sobre la del País

MORTALIDAD BRUTA HOMBRES



MORTALIDAD BRUTA MUJERES




Hay mayor riesgo de morir en Quillota

¿ Es esa Aseveración Real?

M
O
R
T
A
L
I
D
A
D

G
E
N
E
R
A
L



falsa información de que es mayor el riesgo global de morir en la población vieja


¿Cómo comparo la mortalidad entre poblaciones con diferente estructura etárea?

Índice de Swaroop
tasa de mortalidad proporcional

Comparación por Tasas Ajustadas

90%, país desarrollado

INDICE DE SWAROOP QUILLOTA PERIODO




Índice estable.

En más de mitad de los años las mujeres han alcanzado índices de países desarrollados.

Siempre sobre 84 %

INDICE DE SWAROOP GENERAL



En Quillota la personas que fallecen lo hacen a mayor edad.


Diferencia marcada el año 2007 - 2008

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
QUILLOTA	84,9	85,4	84,1	89,9	90	87,1	87,3	85,9	89,9	81,5
CHILE	82,1	82,1	82,3	86,4	87,1	83,9	84,4	84,4	85	74,7


5-7%



INDICE DE SWAROOP HOMBRES



INDICE DE SWAROOP MUJERES



Comparación por Tasas Ajustadas

M
O
R
T
A
L
I
D
A
D

G
E
N
E
R
A
L


QUILLOTA		
	RME	IC (95%)
1999	No calculado por falta de información DEIS	
2000	No calculado por falta de información DEIS	
2001	108,9	99,4 - 118,4
2002	110,8	101,2 - 120,4
2003	103	93,9 - 112,05
2004	107	97,9 - 116,1
2005	No calculado por mal registro DEIS	
2006	105,9	96,9 - 115,0
2007	106,4	97,7 - 115,1
2008	105,8	97,0 - 114,7



La mayoría de los años la diferencia de mortalidad entre Quillota y Chile no fue significativa.

Los habitantes de Quillota no tienen mayor riesgo de morir que en el resto de país


Perfil Histórico Tasas de Mortalidad



Describir evolución y Comparar con Chile

MORTALIDAD INFANTIL

QUILLOTA	
	INFANTIL
AÑO	Defunciones menores de 1 año
1999	15
2000	7
2001	3
2002	11
2003	9
2004	7
2005	11
2006	5
2007	8
2008	9




Sólo en 3 años la tasa de mortalidad infantil superó la nacional.


Tendencia progresiva a la disminución, con años peak

Prematurez - anomalías congénitas


Auditar los casos



Auditar los casos




Perfil Histórico Tasas de Mortalidad



Describir evolución y Comparar con Chile

QUILLOTA		
GRUPOS DE EDAD (años)		
1 a 4		
AÑO	Def	Tasa (*)
1999	5	0,93
2000	0	0
2001	3	0,56
2002	0	0
2003	4	0,83
2004	2	0,4
2005	2	0,43
2006	0	0
2007	0	0
2008	2	0,4
2009	2	0,3



Malformaciones congénitas,
accidentes, prematuridad.

Los Peak tienden a ser
menores


M
O
R
T
A
L
I
D
A
D

E
N

N
I
Ñ
E
Z

QUILLOTA		
	GRUPOS DE EDAD (años)	
	5 a 9	
AÑO	Def	Tasa (*)
1999	0	0
2000	1	0,14
2001	3	0,44
2002	2	0,29
2003	0	0
2004	0	0
2005	1	0,16
2006	0	0
2007	2	0,3
2008	0	0
2009	1	0,16

Consecuencias de parálisis cerebrales, Malformaciones, leucemias



Auditar los casos

Mejores que las cifras nacionales.

C

Perfil Histórico Tasas de Mortalidad



Describir evolución y Comparar con Chile


MORTALIDAD ADOLESCENTE

Nº de mujeres estables 1 o 2 fallecidas por año

Auditar los casos

MORTALIDAD EN ADOLESCENCIA

QUILLOTA			
	AMBOS SEXOS	HOMBRES	MUJERES
AÑO	Defunciones		
1999	3	2	1
2000	9	8	1
2001	12	10	2
2002	2	1	1
2003	5	3	2
2004	6	5	1
2005	8	6	2
2006	7	5	2
2007	4	3	1
2008	5	4	1



	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
AMBOS SEXOS	0,22	0,66	0,88	0,15	0,34	0,4	0,55	0,5	0,3	0,35
HOMBRES	0,29	1,16	1,45	0,14	0,4	0,7	0,79	0,7	0,4	0,55
MUJERES	0,15	0,15	0,3	0,15	0,29	0,1	0,29	0,3	0,2	0,15

SUICIDIOS - AGRESIONES

Nº de hombres mayor que el de mujeres y fluctúa




Perfil Histórico Tasas de Mortalidad



Describir evolución y Comparar con Chile

MORTALIDAD ADULTOS

QUILLOTA				
AÑO	20 A 44 AÑOS		45 A 64 AÑOS	
	H	M	H	M
1999	30	10	61	35
2000	33	11	52	33
2001	24	15	69	39
2002	27	14	73	43
2003	22	10	62	32
2004	29	11	48	38
2005	25	11	54	37
2006	27	12	70	46
2007	18	7	69	38
2008	18	6	70	38



Adultos entre 20 – 44 años,
estable con tendencia al
descenso

Desde el 2005 mortalidad
Hombres en aumento entre los
45 -64 años

Perfil Histórico Tasas de Mortalidad




Describir evolución y Comparar con Chile

QUILLOTA				
AÑO	65 A 79 años		80 y más años	
	H	M	H	M
1999	89	77	89	108
2000	118	78	66	120
2001	101	75	63	101
2002	114	65	66	94
2003	105	70	80	99
2004	116	82	70	125
2005	114	94	76	111
2006	99	71	89	99
2007	109	95	93	130
2008	99	86	87	131

MORTALIDAD ADULTO MAYOR

250
200
150
100
50
0



80 o más años


65 – 79 años

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
HOMBRE 65-79	40,1	52,3	43,99	48,9	41,8	44,8	42,8	35,7	37,9	33,15
MUJER 65-79	25,09,9	24,8	23,6	20,3	21,5	24,8	27,9	20,5	26,8	23,6
HOMBRE 80 y más	139,2	151	139,07	140,7	146,8	122,6	127,3	114,4	114,4	114,01
MUJER 80 y más	139,2	149,8	119,67	106,1	105,7	127,8	108,9	93,1	117,5	114,01

Periodo 65 – 79 años, hombres mayor que mujeres

Tendencia al descenso sobre 80 años

Perfil Histórico Tasas de Mortalidad



2009




Causas de Mortalidad


Unidad de Investigación



Fallecidos (0.69%)



86.160





Ranking	Título	N	%
1	Enfermedades del sistema circulatorio	177	29,60%
2	Neoplasias	140	23,41%
3	Enfermedades del sistema respiratorio	64	10,70%
4	Traumatismos, envenenamientos y otras consecuencias de causa externa	42	7,02%
5	Enfermedades del aparato digestivo	39	6,52%
6	Enfermedades del aparato genitourinario	30	5,02%
7	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	22	3,68%
8	Trastornos mentales y del comportamiento	18	3,01%
9	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	15	2,51%
10	Enfermedades del sistema nervioso	14	2,34%
11	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	11	1,84%
12	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	8	1,34%
13	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	6	1,00%
14	No Tipificados	6	1,00%
15	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo	4	0,67%
16	Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo	2	0,33%

82,3%

2009

Edad de los Fallecidos

Unidad de Investigación




Quillota Población Longeva

- 0 a 9 años
- 10 a 19 años
- 20 a 29 años
- 30 a 39 años
- 40 a 49 años
- 50 a 59 años
- 60 a 69 años
- 70 a 79 años
- 80 a 89 años
- 90 y más años







CHILE: Hipótesis de evolución de la esperanza de vida al nacer por sexo, según quinquenios. 2000-2050

PERÍODO	Esperanza de vida al nacer (en años)		
	Hombres	Mujeres	Diferencial
2000-2005	74,80	80,80	6,00
2005-2010	75,49	81,53	6,04
2010-2015	76,12	82,20	6,08
2015-2020	76,68	82,81	6,13
2020-2025	77,19	83,36	6,17
2025-2030	77,64	83,86	6,22
2030-2035	78,04	84,31	6,27
2035-2040	78,40	84,71	6,31
2040-2045	78,72	85,08	6,36
2045-2050	79,00	85,40	6,40





77 años




2009

Los hombres que No debiesen fallecer aún.








NUMERO DE FALLECIDOS POR GRUPO DE CAUSAS			
	Titulo	Numero de fallecidos	Porcentaje
1	Enfermedades del sistema circulatorio	50	27,47%
2	Neoplasias	46	25,27%
3	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa	33	18,13%
4	Enfermedades del aparato digestivo	18	9,89%
5	Enfermedades del sistema respiratorio	11	6,04%
6	Enfermedades del aparato genitourinario	6	3,30%
7	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	5	2,75%
8	Enfermedades del sistema nervioso	4	2,20%
9	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	3	1,65%
10	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	2	1,10%
11	No Tipificados	2	1,10%
12	Trastornos mentales y del comportamiento	1	0,55%
13	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	0,55%

Cardiovascular




32 % de IAM

24 % de ACV

Control CARDIOVASCULAR

N	DIAGNOSTICO	NUMERO DE FALLECIDOS	Porcentaje
1	INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION	16	32,00%
2	ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO O ISQUEMICO	7	14,00%
3	CARDIOMIOPATIA DILATADA	4	8,00%
4	HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA, NO ESPECIFICADA	4	8,00%
5	EMBOLIA PULMONAR SIN MENCION DE CORAZON PULMONAR AGUDO	3	6,00%
6	DISECCION DE AORTA (CUALQUIER PARTE)	3	6,00%
7	ENFERMEDAD ATROSCLEROTICA DEL CORAZON	2	4,00%
8	FIBRILACION Y ALETEO VENTRICULAR	2	4,00%
9	TRASTORNOS DE LAS VALVULAS MITRAL Y AORTICA	1	2,00%
10	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1	2,00%
11	ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA CON INSUFICIENCIA CARDIACA (CONGESTIVA)	1	2,00%
12	TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR	1	2,00%
13	INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA	1	2,00%
14	OTRAS HEMORRAGIAS SUBARACNOIDEAS	1	2,00%
15	HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA, NO ESPECIFICADA	1	2,00%
16	OTROS INFARTOS CEREBRALES	1	2,00%
17	ENFERMEDAD VASCULAR PERIFERICA, NO ESPECIFICADA	1	2,00%


Neoplasias



Bronquios + Via aérea
Sup + Pleura = 26%

N	DIAGNOSTICO	N	%
1	TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS O DEL PULMON, PARTE NO ESPECIFICADA	7	15,56%
2	TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO, PARTE NO ESPECIFICADA	6	13,33%
3	TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	5	11,11%
4	TUMOR MALIGNO DEL RIÑON, EXCEPTO DE LA PELVIS RENAL	5	11,11%
5	TUMOR MALIGNO DEL RECTO	2	4,44%
6	TUMOR MALIGNO DEL HIGADO, NO ESPECIFICADO	2	4,44%
7	TUMOR MALIGNO DE LA VESICULA BILIAR	2	4,44%
8	TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE, PARTE NO ESPECIFICADA	2	4,44%
9	LINFOMA NO HODGKIN, NO ESPECIFICADO	2	4,44%
10	TUMOR MALIGNO DE LA OROFARINGE, PARTE NO ESPECIFICADA	1	2,22%
11	TUMOR MALIGNO DE LA FARINGE, PARTE NO ESPECIFICADA	1	2,22%
12	TUMOR MALIGNO DEL COLON, PARTE NO ESPECIFICADA	1	2,22%
13	TUMOR MALIGNO DE LA UNION RECTOSIGMOIDEA	1	2,22%
14	TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS, PARTE NO ESPECIFICADA	1	2,22%
15	TUMOR MALIGNO DE LA PLEURA	1	2,22%
16	TUMOR MALIGNO DEL HUESO Y DEL CARTILAGO ARTICULAR, NO ESPECIFICADO	1	2,22%
17	TUMOR MALIGNO DE PARTE ESPECIFICADA DEL PERITONEO	1	2,22%
18	TUMOR MALIGNO DEL PERITONEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	2,22%
19	TUMOR MALIGNO DEL CEREBRO, EXCEPTO LOBULOS Y VENTRICULOS	1	2,22%
20	TUMOR MALIGNO SECUNDARIO DE LOS HUESOS Y DE LA MEDULA OSEA	1	2,22%
21	LEUCEMIA MIELOMONOCITICA AGUDA	1	2,22%

Traumatismos y Causas Externas




1/3 De las muertes por trauma es un suicidio

LUGAR	DIAGNOSTICO	N	%
1	Peatón lesionado en accidente de tránsito no especi	7	21,21%
2	Persona lesionada en accidente de tránsito, de vehí	5	15,15%
3	Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamie	4	12,12%
4	Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento	3	9,09%
5	Caída no especificada, en lugar no especificado	2	6,06%
6	Disparo de otras armas de fuego, y las no especific	2	6,06%
7	Exposición a factores no especificados, en lugar no	2	6,06%
8	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por,	2	6,06%
9	Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae, en	1	3,03%
10	Ahogamiento y sumersión no especificados, en otro	1	3,03%
11	Exposición a corriente eléctrica no especificada, e	1	3,03%
12	Exposición a humos, fuegos o llamas no especificado	1	3,03%
13	Exposición a factores no especificados, en vivienda	1	3,03%
14	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo d	1	3,03%

Digestivo

%

- OTRAS OBSTRUCCIONES INTESTINALES Y LAS NO ESPECIFICADAS
- CIRROSIS HEPATICA ALCOHOLICA
- OTRAS CIRROSIS DEL HIGADO Y LAS NO ESPECIFICADAS
- ENFERMEDAD DEL HIGADO, NO ESPECIFICADA
- PANCREATITIS IDIOPATICA AGUDA
- PANCREATITIS AGUDA INDUCIDA POR EL ALCOHOL




80% muere de
Cirrosis

Respiratorio

%

- NEUMONIA, NO ESPECIFICADA
- ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA C/INFECC. AG.DE VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES
- EDEMA PULMONAR
- OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES CON FIBROSIS
- NEUMOTORAX, NO ESPECIFICADO
- INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA
- OTROS TRASTORNOS RESPIRATORIOS ESPECIFICADOS



55% Neumonía v
Fibrosis Pulmo C

2009

Los Mujeres que No debiesen fallecer aún.






2009

EDAD

Fallecidos Mujeres <= 81 años

Unidad de Investigación





NUMERO DE FALLECIDOS POR GRUPO DE CAUSAS			
Lugar	Título	N	%
1	Neoplasias	56	37,09%
2	Enfermedades del sistema circulatorio	31	20,53%
3	Enfermedades del aparato respiratorio	13	8,61%
4	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	12	7,95%
5	Enfermedades del sistema respiratorio	11	7,28%
6	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa	7	4,64%
7	Enfermedades del aparato genitourinario	6	3,97%
8	Enfermedades del sistema nervioso	4	2,65%
9	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo	3	1,99%
10	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2	1,32%
11	Trastornos mentales y del comportamiento	2	1,32%
13	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	2	1,32%

81,4%


2009

Fallecidos Mujeres <= 81 años

Unidad de Investigación



Neoplasias



49,1%


Diagnóstico	N	%
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	7	12,28%
TUMOR MALIGNO DE LA VESICULA BILIAR	6	10,53%
TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS O DEL PULMON, PARTE NO ESPECIFICADA	6	10,53%
TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	5	8,77%
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO, PARTE NO ESPECIFICADA	4	7,02%
TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS, PARTE NO ESPECIFICADA	3	5,26%
TUMOR MALIGNO DEL PERITONEO, SIN OTRA ESPECIFICACION	3	5,26%
TUMOR MALIGNO DEL COLON, PARTE NO ESPECIFICADA	2	3,51%
TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	2	3,51%
TUMOR MALIGNO DE SITIOS NO ESPECIFICADOS	2	3,51%
LINFOMA NO HODGKIN, NO ESPECIFICADO	2	3,51%
MIELOMA MULTIPLE	2	3,51%
LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA	2	3,51%
TUMOR MALIGNO DEL DUODENO	1	1,75%
TUMOR MALIGNO DE LA UNION RECTOSIGMOIDEA	1	1,75%
TUMOR MALIGNO DEL HIGADO, NO ESPECIFICADO	1	1,75%
TUMOR MALIGNO DE LA PLEURA	1	1,75%
TUMOR MALIGNO DE PARTE ESPECIFICADA DEL PERITONEO	1	1,75%
TUMOR MALIGNO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	1	1,75%
TUMOR MALIGNO DE LA URETRA	1	1,75%
TUMOR MALIGNO DEL ENCEFALO, PARTE NO ESPECIFICADA	1	1,75%
TUMOR MALIGNO DE LA CABEZA, CARA Y CUELLO	1	1,75%
TUMOR MALIGNO DE LA CABEZA, CARA Y CUELLO	1	1,75%
LEUCEMIA AGUDA, CELULAS DE TIPO NO ESPECIFICADO	1	1,75%

Muchas etiologías

Sistema bilio –
digestivo ; 26.3%

Ginecológico; 26.3%

Cardiovascular




Al igual que los hombres, el IAM y el AVE son las Principales causas

Lugar	Diagnóstico	N	%
1	INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION	8	25,81%
2	ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO O ISQUEMICO	6	19,35%
3	HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA, NO ESPECIFICADA	4	12,90%
4	ENFERMEDAD ATEROSCLEROTICA DEL CORAZON	2	6,45%
5	CARDIOMIOPATIA DILATADA	2	6,45%
6	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	2	6,45%
7	FLEBITIS Y TROMBOFLEBITIS DE OTROS VASOS PROFUNDOS DE LOS MIEMBROS INFERIORES	2	6,45%
8	EMBOLIA PULMONAR SIN MENCION DE CORAZON PULMONAR AGUDO	1	3,23%
9	FIBRILACION Y ALETEO AURICULAR	1	3,23%
10	INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA	1	3,23%
11	ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA	1	3,23%
12	ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA	1	3,23%

58,6%

Digestivas


- K550 TRASTORNO VASCULAR AGUDO DE LOS INTESTINOS
- K559 TRASTORNO VASCULAR DEL INTESTINO, NO ESPECIFICADO
- K709 ENFERMEDAD HEPATICA ALCOHOLICA, NO ESPECIFICADA
- K743 CIRROSIS BILIAR PRIMARIA
- K746 OTRAS CIRROSIS DEL HIGADO Y LAS NO ESPECIFICADAS
- K769 ENFERMEDAD DEL HIGADO, NO ESPECIFICADA
- K803 CALCULO DE CONDUCTO BILIAR CON COLANGITIS
- K922 HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO ESPECIFICADA



70% enfermedades hepato
Biliares

Endocrinas

- E112 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON COMPLICACIONES RENALES
- E116 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS
- E141 DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA, CON CETOACIDOSIS
- E142 DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA, CON COMPLICACIONES RENALES
- E146 DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS
- E849 FIBROSIS QUISTICA, SIN OTRA ESPECIFICACION
- E889 TRASTORNO METABOLICO, NO ESPECIFICADO



82% Complicaciones de
Diabetes

GRACIAS