



CONTROL DE SALUD INFANTIL EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL



Trastornos	Total		Hombres		Mujeres		4-11 años		12-18 años	
	%	EE	%	EE	%	EE	%	EE	%	EE
Trastornos ansiosos	18.5	1.1	13.8	1.4	23.5	2.1	21.0	1.8	15.7	1.9
Fobia social	5.5	0.9	2.9	0.8	8.2	1.6	5.9	1.2	5.1	1.3
Trastorno de ansiedad generalizada	8.2	0.9	6.2	1.3	10.3	1.3	8.0	1.7	8.4	1.6
Trastorno por ansiedad de separación	10.2	8.8	7.3	0.9	13.1	1.3	13.4	1.2	6.5	1.5
Trastornos afectivos	6.1	0.8	3.7	1.0	8.6	1.4	3.8	1.1	8.6	1.2
Trastorno depresivo mayor	5.9	0.8	3.6	1.0	8.4	1.4	3.8	1.1	8.3	1.1
Distimia	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.04	0.03	0.3	0.2
Trastornos por componente disruptivo	21.8	1.8	19.9	2.1	23.7	2.8	29.7	3.7	12.8	1.4
Trastorno disocial	3.7	0.5	4.4	0.9	3.0	0.7	1.2	0.3	6.5	1.0
Trastornos oposicionista desafiante	8.7	1.0	7.5	1.1	9.9	1.4	11.8	1.5	5.1	1.2
TDAH	15.1	1.2	13.7	1.6	16.6	2.2	23.9	2.2	5.4	1.4
Trastornos por consumo de sustancias	4.8	0.8	4.6	1.0	4.9	1.0	-	-	10.1	1.7
Abuso de alcohol	1.9	0.6	2.4	0.8	1.3	0.8	-	-	4.0	1.3
Dependencia de alcohol	1.7	0.4	1.5	0.5	1.9	0.7	-	-	3.6	0.9
Abuso de Marihuana	0.4	0.2	0.2	0.1	0.6	0.4	-	-	0.9	0.3
Dependencia de Marihuana	0.4	0.2	0.3	0.2	0.5	0.2	-	-	0.9	0.3
Dependencia de nicotina	1.6	0.4	1.4	0.5	1.8	0.6	-	-	3.4	0.8
Abuso de otras sustancias	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	0.4	0.2
Dependencia de otras sustancias	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	0.4	0.2
Trastorno Alimenticios	0.3	0.2	0.05	0.05	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
Esquizofrenia	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
Cualquier Trastornos	38.3	2.3	33.5	2.5	43.3	3.6	42.9	3.6	33.2	2.4

Prevalencia de trastornos psiquiátricos en el último año sin impedimento en población infanto-juvenil Fuente: Salud mental infanto-juvenil en Chile y brechas de atención sanitarias, 2012

El perfil epidemiológico de los trastornos mentales y del comportamiento en la población infantil chilena, coincide, en términos generales, con los de otros países. A edades más tempranas son más frecuentes los trastornos del comportamiento, mientras que más tarde se presentan mayormente alteraciones de índole ansiosa y afectiva.

De acuerdo a este estudio el 38,3% de los NNA de 4 a 18 años, presentan algún trastorno psiquiátrico, (35,5% para hombres y 43,3% para mujeres). La mayor prevalencia se da en los trastornos disruptivos (21.8%), seguido por los trastornos ansioso (18,5%) y los trastornos afectivos (6,1%).

Al observar específicamente la población de niños y niñas entre 4 y 11 años la prevalencia de trastornos mentales aumenta a un 42,9%. El 29,7% de ellos corresponde a trastornos conductuales y disruptivos, en segundo lugar se encuentra el trastorno por déficit atencional e hiperactividad (23,9%), seguido de los trastornos de ansiedad (21%), con una mayor prevalencia de la ansiedad de separación (13,4%), y finalmente los trastornos afectivos (3,8%).